

毛胫夜蛾 *Mocis undata* (Fabricius) (图版LV-5)

Noctua undata Fabricius, 1775; Syst. Ent. p. 600. (East Indies)

Cauninda undata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 333.

Mocis virbia: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153.

Mocis undata: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 31. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 359. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 849. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 100.

翅展 50 mm。头、胸、腹及前翅灰褐色，前翅带紫色，基线灰黑色，内线为棕色窄带，后端内方一黑斑，环纹为黑点，中线棕色波浪形，后半渗化或成小斑，肾纹大，中有曲纹，外线黑棕色，在亚中褶弯曲向中室下角，亚端线波浪形，内侧一系列黑点，与外线间带暗灰色；后翅暗褐黄色，外线、亚端线黑褐色，后者带状，后半分裂为二并呈波浪形。雄蛾抱钩分叉，腹一支粗，阳茎细长，无角状器（图 629）。




图 629 毛胫夜蛾 *Mocis undata* (Fabricius) ♂ 外生殖器

寄主 鱼藤、山马蝗属；成虫吸食柑橘等果汁。

分布 河北、山东、河南、江苏、浙江、湖南、台湾、福建、江西、广东、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡，缅甸，新加坡，菲律宾，印度尼西亚，非洲。

奸毛胫夜蛾 *Mocis dolosa* (Butler) (图版LV-4)

Plecoptera dolosa Butler, 1880, Proc. zool. Soc. Lond. p. 678. (台湾)

Remigea nigrisigna Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 553.

Cauninda dolosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 333, pl. 63b.

Mocis dolosa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 95. —Draudt, 1950, Mitt.

munch. ent. Ges. 40: 154. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 359. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 849.

翅展 33 mm。头部与胸部灰褐色，下胸与足白色带褐色；前翅灰褐色，布红棕色细点，基线暗褐色，自前缘脉波浪形至亚中褶，内线暗褐色，内侧衬灰白色，在前缘脉后稍外凸，其后直线外斜，后端内方有一黑点，环纹只现一黑点，中线褐色波浪形，模糊，肾纹中有一褐纹，边缘褐色，外侧褐色较外展，外线暗褐色，外侧衬灰白色，自前缘脉后外斜，在 6 脉处内伸，在 3 脉后向内伸至肾纹后端，再折向后，内凸于亚中褶，其后外弯，亚端线浅褐灰色，内侧衬暗褐色，锯齿形，端区带有褐色，端线褐色波浪形，缘毛灰白色带褐色；后翅淡灰褐色，外线黑褐色，锯齿形，亚端线灰白色，两侧黑褐色，锯齿形，翅外缘中段褐色，缘毛白色带褐色；腹部淡褐灰色，腹面灰白色带有褐色。

分布 河北、山东、江苏、浙江、台湾、福建、云南；日本。

黑斑毛胫夜蛾 *Mocis discios* (Kollar) (图版LV-6)

Ophiusa discios Kollar, 1844, Hügel. Kaschmir, 477. (喜马拉雅山)

Mocis discios: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 104, pl. 223, fig. 32.

Cauninda discios: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 335.

翅展 45mm。头部与胸部紫灰色杂有褐色；前翅紫灰色，布有褐色细点，部分带褐色，内线黑褐色，较直后垂，线内侧衬灰白色，外侧一黑褐带，在中室后扩展，其外缘近达外线，环纹不显，肾纹不明显，内外侧衬褐色，外侧有一黑褐色三角形斑，外线深褐色，自前缘脉后外弯，6 脉后内斜达亚中褶，再回弯达肾纹后，其后稍外弯向后，线外侧有一黑褐带，微曲内斜，亚端线隐约可见，锯齿形，在各翅脉上为黑点，翅外缘前半褐色，端线褐色，波浪形；后翅灰色带褐色，外线褐色，不明显，亚端线仅现一暗褐影，端线褐色；腹部灰色带褐色。

分布 西藏。

宽毛胫夜蛾 *Mocis laxa* (Walker) (图版LV-7)

Phurys laxa Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1486. (未注明模式产地)

Drasteria pavona Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 117, fig. 9.

Remigia laxa: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 525.

Cauninda laxa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 334, pl. 61g.

Mocis laxa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 103. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 359.

翅展 42 mm。头部棕色带紫灰色，触角灰白色，有暗褐纹；胸部棕色杂紫灰色；前翅淡紫灰色，密布棕色细点，基线棕色，自前缘脉外弯至 1 脉，内线棕色，内侧衬灰