

抱器瓣短宽，端部钝圆 翼毛胫夜蛾 *M. ancilla*

实毛胫夜蛾 *Mocis frugalis* (Fabricius) (图版LV-3)

Noctua frugalis Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 601. (印度)
Chalciope lycopodia Geyer, 1837, Hübner's Zutr. 5: 25.
Remigia translata Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 1015.
Remigia frugalis: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 190. —Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 527. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 333, pl. 61g. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 360. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 849. —
Mocis frugalis: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 31.

翅展 37 mm。头部与胸部灰褐色，下胸与足有赭色毛；前翅褐灰色带有红棕色并布有褐色细点，内线隐约可见，褐色波曲，后端内侧有一黑点，环纹只现一黑点，肾纹中央为褐色曲纹，边缘暗褐色，中线隐约可见褐色波浪形，自中室下角内斜至翅后缘，外线褐黄色，外侧衬暗棕色，自 7 脉直线内斜至翅后缘，亚端线灰色，较弱，在各翅脉上有黑点，波浪形内斜，顶角有一黑褐色模糊内斜纹，亚中褶近中部有一黑灰色条纹，端线黑色，波浪形，缘毛中有一褐线；后翅灰褐色，外线暗褐色，在亚中褶处稍外弯，亚端线暗褐色双线，较模糊，在顶角区渗化，端线暗褐色，缘毛中有一褐线；腹部灰褐色带有赭色。

雄蛾抱器瓣端稍尖，抱钩二叉形，阳茎极细，无明显的角状器（图 628）。




图 628 实毛胫夜蛾 *Mocis frugalis* (Fabricius) ♂ 外生殖器

寄主 蕹荷科植物。
分布 台湾、福建、广东、海南、广西、云南；印度，锡金，缅甸，斯里兰卡，马来西亚，新加坡，印度尼西亚，大洋洲等。