

分布 云南；缅甸。

绢夜蛾属 *Elydnodes* Hampson

Elydnodes Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 399.

Type-species: *Carea variegata* Leech.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节短，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形；胸部毛、鳞混杂，翅基片端部有长匙形鳞，后胸有一对毛簇；前翅顶角较尖突，外缘前半凹，后半内斜，有一副室；后翅中室长约为翅之半，5脉发达，自中室下角发出。

绢夜蛾 *Elydnodes variegata* (Leech) (图版 I-23)

Carea? variegata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 524. (中国西部: Choupinsa) .

Elydnodes variegata: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 400, text fig. 101. —

Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 239, pl. 76, fig. 1738.

翅展 38—40mm。头部灰棕色；胸背及前翅褐黄，前翅前缘棕色，外缘中部一片棕色，内、外线棕色，顶角有一内斜棕色带，带外侧为黄色三角区；后翅浅黄；腹部灰棕色。

分布 四川。

縊夜蛾属 *Moma* Hübner

Moma Hübner, [1820] 1816, Verz. Schmett., p. 203.

Type-species: *Noctua aprilina* Linnaeus, sensu Hübner 1803.

Diphteramoma Berio, 1961, Mem. Soc. ent. Ital. 40: 114.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，前缘饰毛，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部被粗毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇，翅基片端部有毛簇，胫节饰毛；腹部背面有一列毛簇；前翅有一副室；后翅5脉微弱，自中室横脉近中部发出。

种 检 索 表

前翅外缘至外线间带黑色 广縊夜蛾 *Moma tsushimana*
前翅仅外线外侧有一黑带 縊夜蛾 *M. alpium*

縊夜蛾 *Moma alpium* (Osbeck) (图版 II-1)

Phalaena Noctua alpium Osbeck, 1778, Goth. Wet. Witt. Samh. 1: 52, pl. 1, fig. 2. (德国)

Diphtera alpium: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 11, pl. 2c.

Moma alpium: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 673, pl. 165, figs. 5, 6. —
Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 952.

Daseochaeta alpium: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 30.

翅展 36mm。头、胸及前翅浅绿色，颈板黑色；前翅中褶与亚中褶白色，基线为黑带，内、外线黑色，后者双线，环纹黑边，肾纹内缘为黑条；后翅褐色，外线后半白色，臀角一白纹。

寄主 山毛榉、桦、栎属。

分布 黑龙江、湖北、江西、福建、四川、云南；日本，朝鲜，欧洲。

广缤夜蛾 *Moma tsushimana* Sugi (图版 II-2)

Moma tsushimana Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. p. 673, pl. 165, figs. 8, 9 adults, pl. 358, fig. 10 male genitalia. (日本)

翅展 32mm。头、胸绿色，颈板黑色；前翅浅绿色，基线仅现一黑斑，内线黑色带状，环、肾纹只现不完整黑边，前缘区中段有三个黑纹，环纹后有黑曲线，外线黑色，亚端区在中褶与亚中褶各一黑斑；后翅浅黑褐色，亚中褶端部一黄白斑；腹部褐色。雄蛾抱器瓣宽，腹近端有一突（图 29）。




图 29 广缤夜蛾 *Moma tsushimana* Sugi ♂ 外生殖器

分布 江西；日本。

莽夜蛾属 *Raphia* Hübner

Raphia Hübner [1821] 1816, Verz. Schmett. p. 212.