

翅展 58—68mm。头、胸暗褐色；前翅黑褐带灰色，中区带黑色并有绿色感，翅脉微灰，翅后缘浅赭黄色，基线由双列小黑斑组成，各斑均围以黄边，内线、亚端线黄灰色，后者两侧衬黑色，剑纹、环纹及肾纹大，黑褐色，环纹与肾纹外缘中凹，肾纹后端内突，中线模糊黑色，外线双线黑色，外方各翅脉上有黑长点，内侧有黄灰线分割的黑斑，线外方另有一黑点组成的线；后翅暗褐色；腹部灰褐色。

分布 湖南；日本，朝鲜。

脉莫夜蛾 *Mormo venata* (Hampson) (图版XXVII-30)

Mania venata Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 52, pl. 108, fig. 19. (中国西部：Nitou)

Mormo venata: Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 975.

翅展 50—54mm。头、胸及前翅暗褐杂灰色，前翅中区大部带黑褐色，后缘赭黄，翅脉带有灰黄色，基线、内线及亚端线黄灰色，后者锯齿形，基线两侧有黑斑点，内线两侧衬黑色，前端呈斑状，剑纹、环纹及肾纹大，环纹中凹，肾纹外缘中凹，两纹均黄灰色，外线双线黑色前段粗，亚端区前端一褐黑斑，外线外方另一黑点组成的黑线；后翅暗褐色；腹部灰褐色。

分布 湖南、四川、云南。

黄褐莫夜蛾 *Mormo nyctichroa* (Hampson) (图版XXVIII-1)

Mania nyctichroa Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 53, pl. 108, fig. 20. (江西九江)

Mania nyctichroa: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 162.

翅展 52—54mm。全体褐色，头、胸及前翅杂灰色，翅脉纹浅褐黄色，基线由双列小黑斑组成，1脉基部前方有一群黑点，内线褐灰色，后端内侧有一群黑点，剑纹、环纹及肾纹大，暗褐色，肾纹后端内突，外侧一黑曲纹，中线模糊，外线双线黑色锯齿形，后段波浪形，外方有双列黑点并一黑线，此线与亚端线间成一黑褐带，亚端线灰色，后端伸达臀角，外侧中部黑褐色。

分布 江西。

暗莫夜蛾 *Mormo phaeochroa* (Hampson) (图版XXVIII-2)

Mania phaeochroa Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 53, pl. 108, fig. 21 (中国西部：Washan)

Mania phaeochroa: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 163.

翅展 58—60mm。头、胸及前翅褐色带灰色，前翅基线、内线均双线黑色，后者波浪形，后半内侧有黑点群，剑纹、环纹大，中线黑褐色，外线前端为双黑纹，其后不明