

外线双线锯齿形，中部成大外突齿，前段内侧带白色，后半段与内线间带白色，亚端线双线锯齿形，线间微白，端线为一列衬黄的黑点，后翅红色，中部一黑色双曲带，端区一黑宽带，其内缘双曲，缘毛黑白相间；腹部灰褐色。

**寄主** 蒙古栎、榭。

**分布** 黑龙江、内蒙古、河南；日本，俄罗斯。

### 苹刺裳夜蛾 *Mormonia bella* (Butler) (图版 XLIV-22)

*Catocala bella* Butler, 1877, Cist. Ent. 2: 242. (日本横滨)

*Mormonia bella*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phao. Br. Mus. 12: 57. —Mell. 1936, Dt. ent. Z. Iris 50: 63. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 345.

*Catocala bella*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Motha Jap. 1: 841.

翅展 56mm。头及颈板赭褐色，胸部灰棕色；前翅蓝灰带黑褐色，基线、内线黑色波浪形，肾纹褐色，边缘灰及暗褐色，外线黑色锯齿形，在 2 脉处内突并膨大达 2 脉基部，亚端线蓝灰色，两侧黑褐色，锯齿形，端线为一列黑白相衬的点；后翅黄色，基部及后缘区黑褐色，中带黑色，其中部外弓，端区一黑宽带，顶角浅黄色；腹部暗褐色。

**寄主** 苹果。

**分布** 黑龙江；日本。

### 晦刺裳夜蛾 *Mormonia abamita* (Bremer et Grey) (图版 XLIV-23)

*Catocala abamita* Bremer et Grey, 1853, Schmett. Nord. Chin. p. 19. (北京)

*Catocala scortum* Christoph. 1893, Iris, 6: 94.

*Mormonia abamita*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 52. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 303, pl. 63d. —Chu et al., 1963, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 1: 106. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 344.

翅展 65—70mm。头、胸灰褐色；前翅灰色，布有细黑点，前缘基部至 2 脉基部一黑褐斜条，内线黑褐色波浪形，自斜条后外斜，肾纹黑边，中央另一黑环，中线仅前半可见黑色，外斜至肾纹，外线黑色锯齿形，在 5 脉前后成锐齿，在亚中褶有一黑纹内伸至内线，亚端线灰白色，在 6 脉处有一黑纹伸至顶角，端线为一列黑点；后翅黄色，中带及端带黑色弯曲，后者后端断为水滴状；腹部褐黄色。

**分布** 河北、山东、江苏、江西、福建。

### 甘草刺裳夜蛾中亚亚种 *Mormonia neonympha variegata* Warren (图版 XLIV-26)

*Mormonia neonympha* ssp. *variegata* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 330, pl. 54c.  
(中亚地区)

*Mormonia neonympha*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 345.