

分布于南疆的喀什、叶城、民丰。国外见于苏联哈萨克,阿富汗,克什米尔地区北部,巴基斯坦等地。

据 Ellerman & Morrison-Scott (1951) 记载,南疆地区分布的属于本亚种。钱燕文等(1965),该种在南疆有分布。

(2) 东北亚种 *Mustela erminea transbaikalica* Ognev

1928. *Mustela erminea transbaikalica* Ognev, Mem. Soc. Amis. Sci. Nat. Moscou, Sect. Zool. 2: 14, 29 (模式产地: 贝加尔湖东岸,索斯洛夫卡)。

分布黑龙江哈尔滨、牡丹江、密山、伊春,吉林及内蒙古的额尔古纳左旗(根河)、鄂伦春自治旗(阿里河)、喜桂图旗(牙克石)、呼伦贝尔盟、乌兰浩特。国外见于苏联外贝加尔。

夏毛背部灰棕色,腹部白色。冬季除尾部黑色外,全身雪白色。

量衡度:

外形 (衡: 克;度: 毫米)

标本号	性别	体重	体长	尾长	耳长	后足长	产地
73001	♂	105.5	220	80	15	37	黑龙江根河
73002	♂	—	217	42	18	38	黑龙江根河
73003	♀	60	190	65	11.8	30	黑龙江根河

头骨 (毫米)

标本号	性别	颅基长	基底长	吻长	颧宽	眶间宽	后头宽	听泡长	上齿列长
73001	♂	43.9	41.7	11.3	24.1	10.3	21.7	15.4	14.0
73002	♂	43.3	40.3	11.8	23.5	10.2	20.7	13.8	14.2
73003	♀	38.9	35.2	9.60	19.3	8.10	18.4	12.5	11.7

17. 伶鼬 *Mustela nivalis* Linnaeus (图版四,图3)

1766. *Mustela nivalis* Linnaeus, Syst. Nat. 12th ed. 1:69. (模式产地: 瑞典,韦斯德博顿)。

别名: 银鼠、白鼠、矮伶鼬。

鉴别特征 为鼬科体形最小的一个种。尾极短,约为体长的 1/5 或短些,接近于后足长。颊齿间宽略等于眶间宽。阴茎骨先端呈钩形。

形态 身体细长,四肢短,耳朵亦小。被毛短而致密,蹠行性。足掌被短毛,趾、掌垫隐于毛中。足具五趾,爪稍曲且纤细,很尖锐。前肢腕部着生数根白长毛。雌兽乳头腋下 2 对,鼠蹊部 3 对。

毛色: 本种冬、夏毛异色。夏季,背面自上唇向后经体侧、直至尾端及四肢外侧为褐色或咖啡色。腹面从喉、颈侧到腹部呈白色。背、腹间分界线明显而整齐。足背杂生白毛。体躯的褐色毛或白色毛从基部至尖端颜色相同。冬季被毛白色。少数个体尾端混生