

(2) 四川亚种 *Mustela nivalis russelliana* Thomas

1911 *Mustela russelliana* Thomas, Abstr. Proc. Zool. Soc. 4: Proc. Zool. Soc. 168. (模式产地: 四川康定“打箭炉”).

分布于四川康定, 马尔康。雅江一线以北, 即川西北横断山脉高山草甸地区。

体形很小。背部暗褐色, 腹部浅黄而带粉红色。具暗色嘴斑。尾近体长 $1/2$ 。

量衡度:

外形 (毫米)

性 别	体 长	尾 长	后 足 长	耳 长	产 地
♂	138	54	24	—	四川康定
♀	133	54	22	11	四川康定
*♀	146	53	21.3	9.5	四川马尔康

头骨 (毫米)

颅 全 长	基 长	颧 宽	眶 间 宽	腭 长	上 齿 列 长
29.3	27.2	15.2	6.2	11	8

* 除*者外, 均录自 Allen (1938)。

(3) 莎车亚种 *Mustela nivalis stoliczkana* Blanford

1877 *Mustela stoliczkana* Blanford. Jour. Asiat. soc. Bengal, 46, 2:260 (模式产地: 新疆莎车)。

1766 *Mustela nivalis* Linnaeus, Syst. Nat. 12th ed 1:69 (模式产地: 瑞典, 韦斯德博顿)。

分布新疆南部。

依文献记载, 本亚种背面茶褐色, 腹面白色; 眼角前具一白色圆斑。嘴角后有褐色斑; 尾长略为身长 $1/3$ 。

关于本亚种的资料, 至今报道甚少。

18. 香鼬 *Mustela altaica* Pallas (图版四, 图 1)

1811 *Mustela altaica* Pallas, Zoogr. Ross. As. 98 (模式产地: 阿尔泰山)。

别名: 香鼬子、香鼠(商品名)。

鉴别特征 体形像黄鼬, 但较小。夏毛背面呈暗棕黄色, 腹部淡黄色, 腹侧间界线明显, 冬毛则界限不显。嘴角具淡褐色斑点。眶后突后部狭缩处不显著凹陷, 两听泡间内缘平行。

形态

外形: 体形类似黄鼬, 而较小。躯体细长, 颈长, 四肢短, 尾不甚粗。一般尾长不及体长之半。尾毛比体毛长, 略蓬松。蹠部毛被稍长。半蹠行性。前、后足 5 趾, 爪微曲而稍纤细。前足趾垫卵圆形, 掌垫 3 枚, 略圆, 腕垫一对。后足掌垫 4 枚, 形似前足, 多隐于毛中。乳头 4 对。