

外形 (衡: 克; 度: 毫米)

性 别	体 重	体 长	尾 长
♂♂ (581)	771.7 (500—1200)	359.3 (320—420)	194.3 (130—250)
♀♀ (338)	339.7 (248—453)	295.0 (220—330)	158.0 (122—198)

头 骨 (毫米)

性 别	颅 全 长	颧 宽	眶 间 宽	后 头 宽	听 泡 长	上 齿 列 长
♂♂	64.1 (59.2—71.0)	33.9 (28.5—37.5)	12.9 (11.2—15.0)	29.2 (26.0—33.5)	18.8 (17.5—21.5)	21.3 (19.0—23.0)
♀♀	54.1 (51.0—58.0)	27.5 (26.0—29.8)	10.5 (10.0—12.0)	23.9 (22.0—25.5)	16.7 (16.0—18.5)	18.0 (17.0—20.0)

(4) 东南亚种 *Mustela sibirica davidiana* Milne-Edwards

1872. *Putorius davidianus* Milne-Edwards, Nouv. Arch. Mus. N. H. Paris, 7, Bull.: 92 (footnote) (模式产地: 江西)。

1904. *Putorius sibiricus notis* Barrett-Hamilton, Ann. Mag. N. H. 13: 390 (模式产地: 福建)。

1922. *Lutreola melli* Matschie, Arch. Nat. 88, sect. A, 10: 35 (模式产地: 广州)。

分布: 浙江南部和西部、安徽南部、江西、福建、湖南、湖北南部平原以及广东、广西、贵州的大部, 云南昆明以南地区。

湖北沔阳、鹤峰, 福建福州、闽侯, 湖南宜章, 广东连平, 云南昆明, 贵州松桃、都匀, 广西柳州、梧州, 浙江舟山、岱山。

**形态** 本亚种的毛色略带红而呈红棕色。体形亦较大, 针毛相对短而绒毛稀, 体毛并不蓬松, 尾亦显得细长。毛皮质量以湖区, 例如洞庭湖、鄱阳湖地区和浙江东部沿海所产者为佳。

量衡度:

外形 (衡: 克; 度: 毫米)

性 别	体 重	体 长	尾 长
♂♂ (188)	811 (575—1150)	365 (315—420)	200 (145—245)
♀♀ (170)	344 (265—500)	295 (270—340)	170 (156—187)

头 骨 (毫米)

性 别	颅 全 长	颧 宽	眶 间 宽	后 头 宽	听 泡 长	上 齿 列 长
♂♂ (188)	63.9 (59.0—69.0)	34.1 (31.0—39.0)	13.5 (11.5—15.0)	29.6 (27.0—32.0)	18.9 (17.0—20.0)	21.0 (19.0—23.5)
♀♀ (170)	53.5 (51.4—57.0)	27.1 (25.5—29.0)	10.8 (10.0—12.0)	23.7 (22.5—26.0)	16.7 (15.2—17.8)	17.6 (17.0—19.0)