

和下颌白斑大小均似有变异,我们不做讨论。

另指名亚种,可能尚见于新疆阿勒泰地区。

2. Allen (1938) 将华北、华东和西南地区划为 *fontanieri*、*dauidiana* 和 *moupinensis* 三个亚种,同时合并 5 个种和亚种。

3. Hodgson (1842) 提出的 *M. s. canigula*, 标本得自拉萨。主要特征是毛被肉桂色,没有黑尾尖。我们在 1975 年得自拉萨的鼬皮与 *moupinensis* 相似,暂将 *M. s. canigula* 存疑。

4. 台湾黄鼬仅栖于台湾高山地区,仍保留为台湾亚种。

亚种

(1) 指名亚种 *Mustela sibirica sibirica* Pallas

1773 *Mustela sibirica* Pallas, Reise. Russ. Reichs. 2, appendix: 701. (模式产地: 乌斯季卡缅诺哥尔斯克附近,西阿尔泰)。

分布: 主要分布大兴安岭,伊图里河,博克图,科尔沁右翼前旗(大黑沟)和鄂伦春旗。新疆阿勒泰可能亦系本亚种。

体形略小于 *manchurica*, 被毛黄色不鲜明,且较浅淡。

量衡度:

外形 (衡: 克;度: 毫米)

标本号	性 别	体 重	体 长	尾 长	后 足 长	耳 长
01477	♂	402	285	169	57	23
40975	♂	380	343	189	61	17
40976	♂	355	333	178	59	16
40979	♂	450	356	173	61	17
40974	♂	500	361	190	63	17
40965	♂	510	350	185	58	15
40963	♂	410	350	170	65	15
40994	♂	470	350	175	60	15
40964	♂	245	340	160	58	17
40801	♂	550	465	195	65	17
01469	♀	304	281	162	49	18
40982	♀	200	285	120	45	17

头 骨 (毫米)

标本号	性别	颅基长	基底长	吻宽	眶间宽	颧宽	后头宽	听泡长	上齿列长
03730	♂	62.6	56.1	15.2	12.1	31.9	27.6	18.4	20.9
03731	♂	61.5	54.5	16.1	12.1	32.1	27.8	18.3	20.1
03732	♂	60.9	54.8	16.1	13.1	31.1	27.5	17.1	19.8
03738	♂	60.9	54.5	16.9	12.5	31.5	26.4	18.8	20.1
03740	♂	58.9	51.9	15.9	12.1	31.5	27.2	18.9	19.9