

头骨(毫米)

性 别	颅全长	颧 宽	眶间宽	后头宽	听泡长	上齿列长
♂♂ (17)	61.4 (56.8—67.0)	32.8 (29.0—37.0)	13.0 (12.0—15.0)	28.8 (25.0—34.0)	18.2 (17.0—20.5)	21.1 (19.0—24.5)
♀♀ (3)	52.7 (50.7—54.5)	25.5 (23.9—27.0)	10.1 (9.5—11.0)	23.1 (22.3—24.0)	16.5 (16.0—17.0)	17.3 (16.8—18.0)

(6) 台湾亚种 *Mustela sibirica taivana* Thomas

1913. *Mustela (Lutreola) taivana* Thomas, Ann. Mag. N. H. 12:91 (模式产地: 阿里山)。

分布: 台湾省阿里山、太平山的 1000—3000 米山区。

(7) 西藏亚种 *Mustela sibirica canigula* Hodgson

1842. *Mustela canigula* Hodgson, J. Asiatic Soc. Bengal, 11: 279 (模式产地: 西藏拉萨)。

分布: 原载标本得自拉萨。

据 Hodgson (1842) 所载, 毛被肉桂色, 没有黑尾梢。立此存疑。

我们于 1975 年采自拉萨的三张黄鼬皮, 全身暗棕褐色, 尾梢毛色仍显暗褐色, 针毛较细, 约 100 微米。具有典型的高原型特征。归入西南亚种。

21. 纹鼬 *Mustela strigidorsa* Gray (图版四, 图 5)

1853. *Mustela strigidorsa* Gray, (Hodgson), Proc. Zool. Soc. 191 (模式产地: 锡金)。

别名: 背纹鼬、纹鼬。

鉴别特征 体形似黄鼬。背部中央从枕部直到尾根具一条银白色窄纹。上唇、两颊、下唇、喉部、前胸为淡黄色, 向后到鼠蹊部形成腹纹。

形态 体形似黄鼬。体躯被毛短。鼻垫呈肉红色。眼先、两颊及嘴角都具侧生长毛。尾长大于体长之半, 尾毛较长而稍蓬松。蹠行性。脚掌裸露, 掌、趾垫很发达。前、后足均具 5 趾, 趾端爪短曲, 稍弱。

毛色: 夏季体躯毛被红棕色, 具光泽。毛的下半段及底绒淡棕色, 在绒毛中散生有白色或浅色的针毛。吻、额、颈部毛色略浅淡, 呈棕褐色。背面中央自枕部直至尾基部, 具一条银白色窄纹。少数个体的背纹于头顶及枕部之间断续相连。故称背纹鼬。上唇缘、两颊后、下唇、喉部及前胸淡黄色, 向后延至阴囊前端形成腹纹。于鼠蹊部扩大成块状。尾色同于体色。冬季体躯棕褐色。头、颈部棕色。

头骨: 吻部略短宽, 额骨较平。泪骨钩状突明显。眶间宽与脑室前端的狭缩部分几乎等宽。颧弓粗壮, 略向外侧扩张, 颧宽超过颅全长之半, 颧骨突显然突出, 与眶后突接近构成眼眶后缘。矢状嵴明显。人字嵴发达, 在顶骨与枕骨会合处向后上方突出。乳状突不显著, 听泡小而侧扁, 近似方形。后关节突特别发达, 略超过关节窝横面 1/2。