

前翅内线直 宏秘夜蛾 *M. grandis*

秘夜蛾 *Mythimna turca* (Linnaeus) (图版XIX-26)

Phalaena Noctua turca Linnaeus, 1761, Fn. Suec. p. 322.

Mythimna turca: Leech, 1889, Trans. ent. Soc. Lond. p. 130. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 713. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 304.

翅展 40—43 mm。头部红褐色；胸部红褐带浅紫色；前翅红褐色，密布暗褐细纹，内、外线黑色波曲，剑纹、环纹不显，肾纹为斜窄黑条，后端一白点；后翅红褐色，端区带灰黑色；腹部黄褐色。雄蛾前翅反面的中室区饰银色毛。

分布 黑龙江、湖北、江西、四川；日本，欧洲。

曲线秘夜蛾 *Mythimna divergens* Butler (图版XIX-27)

Mythimna divergens Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 79. (日本)

Mythimna divergens: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 713. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 90.

翅展 50—56 mm。头部深红棕色；胸部与前翅赭黄色，后者有霉绿色调并布有黑细点，前缘脉红棕色，基线、内线、外线均黑色，无环纹，肾纹细窄，黄白色，后端内突并有一黑点，肾纹外方有暗褐云；后翅桃红色带暗褐；腹部棕色。前、后翅反面紫红色。

分布 黑龙江、陕西；日本。

宏秘夜蛾 *Mythimna grandis* Butler (图版XIX-28)

Mythimna grandis Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 79. (日本横滨)

Eriopyga grandis: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 609.

Hyperiodes grandis: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 94.

Mythimna grandis: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 713. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 304.

翅展 55 mm。头、胸褐黄带灰色；前翅浅黄灰色带浅紫褐色，基线、内线、外线黑色，肾纹窄曲，黄白色，后端两侧各一黑点，翅外半有浅色裂纹；后翅红褐带暗褐色；腹部褐色。

寄主 地杨梅属。

分布 甘肃、湖北、四川；朝鲜，日本。

艺夜蛾属 *Hyssia* Guenée

Hyssia Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. Natur. Ins., Noct. 1: 345.