

白色锯齿形，端线为一列黑点；后翅黄白带紫灰色；腹部黑褐色。

分布 四川；朝鲜，印度，缅甸，菲律宾，印度尼西亚。

螟蛉夜蛾属 *Naranga* Moore

Naranga Moore, 1881, Proc. zool. Soc., Lond. p. 359.

Type-species: *Xanthodes diffusa* Walker.

喙退化为很小，下唇须向上伸，第二节约达额中部，第三节中等长度，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角中部扁片形；胸部几全为鳞片，无毛簇，胫上鳞片平滑，距长；腹部无毛簇；前翅后缘比较长，形成外缘与前缘比较垂直。

种 检 索 表

- 雄蛾前翅端区带红色 螟蛉夜蛾 *Naranga diffusa*
- 雄蛾前翅端区不带红色 稻螟蛉夜蛾 *N. aenescens*

稻螟蛉夜蛾 *Naranga aenescens* Moore (图版 XLI-57)

Noctua aenescens Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 359. (台湾)

Noctua brunnea Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 632.

Naranga aenescens: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 632. — Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 282, pl. 51n. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 333. — Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 823. — Chen, 1993, in Huang Anim. Longqi Mt. p. 529.

翅展 16—18 mm。雄蛾头部与胸部褐黄色；前翅金黄色，前缘区基部红褐色，后缘区基部微带血红色，一红褐色内斜条自前缘脉近中部至翅后缘内中区，其外缘在中褶与亚中褶处稍外凸，另一红褐色较窄条自顶角内斜，其内缘在中褶及亚中褶处稍内凸，在亚中褶之后稍外斜，后翅暗褐色，缘毛黄色；腹部褐黄色。

雌蛾头部与胸部赭黄色；前翅淡赭黄色，红褐色内斜条不伸达翅前缘，中室端部及外方有一浅红纹；后翅黄色，除外缘区外微带褐色。

幼虫绿色，背线与亚背线白色，气门线浅黄色。第一、二对腹足不发达。

寄主 稻、高粱、玉米、稗、茅草、茭白等。

分布 河北、陕西、江苏、湖南、江西、台湾、福建、广西、云南；日本，朝鲜，缅甸，印度尼西亚。

生活习性：一年发生 2—5 代，雌蛾产卵成块，老熟幼虫在叶片上部吐丝将叶片卷成三棱形包，化蛹其中。