

白玷尺蛾 *Naxidia hypocyrta* Wehrli, 1931

Naxidia hypocyrta Wehrli, 1931, Neue Beitr. syst. Insect. 5: 21. (四川: 西俄洛)

非常近似点玷尺蛾。但下唇须较短; 角纤毛长度大于触角干直径; 体和翅色浅, 后翅白色无斑纹。


未见标本。上文根据 Prout (1936) 整理。

分布: 四川。


小玷尺蛾 *Naxidia glaphyra* Wehrli, 1931 (图版 V: 12)

Naxidia irrorata glaphyra Wehrli, 1931, Neue Beitr. syst. Insect. 5: 20 (四川)


Naxidia glaphyra: Prout, 1936, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 95, pl. 9: g.



278



279



280

图 278—280 雌性外生殖器. 278. 小玷尺蛾 *Naxidia glaphyra* Wehrli;

279. 弥玷尺蛾 *N. irrorata* (Moore); 280. 雾玷尺蛾 *N. roseni* Wehrli

前翅长: ♂ 12—14 mm, ♀ 13—15 mm。体及翅色较点玷尺蛾深; 翅浅灰褐至灰褐色, 偶有污白色, 但仍带有少量灰褐色, 尤以后翅外缘附近明显; 前翅中点外侧由小点组成的深色半圆圈通常鲜明。触角纤毛远短于触角干直径。

雄性外生殖器 (图 277): 阳端基环略狭长, 其中突较短, 长度约为钩形突长的 0.9 倍。

雌性外生殖器 (图 278): 囊导管细长骨化, 中部有一膜质关节, 下端逐渐过渡到袋状囊体。囊片细小, 11 片。