

uestermani) (顾文元等, 1978)。

肺吸虫卵随豹类粪便排出, 入水则虫卵在蟹类体内发育为囊蚴。从而构成并殖吸虫疫源地的条件。人们进食蟹就会发病, 在患者胸部 X 光片上, 可发现肺吸虫囊肿的阴影。

亚种 我国云豹有 2 亚种。

(1) 指名亚种 *Neofelis nebulosa nebulosa* Griffith

1821 *Felis nebulosa* Griffith, Descr. Anim. (Carn.) 37, pl. (模式产地: 广东广州)。

1922 *Felis (Neofelis) melli* Matschie, Arch. Nat. 88, sect. A, 10:35 (可能产广州)。

分布于长江以南的大陆各省和海南岛。

形态见种。

(2) 台湾亚种 *Neofelis nebulosa brachyurus* Swinhoe

1862 *Leopardus brachyurus* Swinhoe, Proc. Zool. Soc. London, 352, pl. 43 (模式产地: 台湾)。

产于台湾省东部、南部 1000 米高山森林中, 北部较少。

与指名亚种相似, 唯尾短, 尾长 55—60 厘米。

XXXII 豹属 *Panthera* Oken, 1816

1816 *Panthera* Oken, Lehrb. Naturgesch. 3, 2:1052. 模式种: *Felis pardus* Linnaeus.

1816 *Tigris* Oken, Lehrb. Naturgesch. 3, 2:1066.

1843 *Tigris* Gray, List Mamm. B. H. 40.

1868 *Pardus* Fitzinger, S. B. K. Akad. Wiss. Wien, 58, I:459. 模式种 *Felis pardus* Linnaeus.

参阅: Allen, 1938, 472—488; Pocock, 1939, 495—540; Ellerman 等, 1950, 315—319; Новинков, 1956, 266—274; 寿振黄等, 1962, 404—411。

形态 本属是猫科中最大型的兽。体长 1 米以上, 尾长 1 米左右, 体重一般超过 50 公斤, 最重可达 320 公斤。体形似猫。头大, 吻短, 颈粗, 四肢强壮有力, 爪锐利, 且能收缩。

头骨: 颅形狭长。成兽骨质粗坚硬实, 矢状嵴、人字嵴隆起。颧弓宽大而厚。犬齿特别发达。额骨高于顶骨。上腭骨较宽。听泡发达, 似呈椭圆状。下颌骨的底缘较平, 角突发达。

牙齿: 齿式为: $\frac{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1}{3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 30$ 。门齿较小, 横排一列, 外侧门齿较内侧门齿大, 最中间的门齿最小。犬齿粗大呈圆锥状, 其后缘刃部锋利, 顶端尖锐。第一前臼齿缺如, 第二前臼齿和臼齿形小, 有的个体甚至退化。裂齿发达, 臼齿横列。

地理分布 豹属广布于亚洲、非洲和美洲。

我国东北、西北、华北、西南、华南、中南、华东均有分布。现除台湾、辽宁、宁夏和山东