

络夜蛾属 *Neurois* Hampson

Neurois Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 610.

Type-species: *Diphthera nigroviridis* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，前缘饰毛，额斜圆，端部粗糙，微突，雄蛾触角线形，前足胫节无刺，中、后足胫节具刺，前足胫节长于跗基节，后胸有背毛簇，前翅有一副室。雄蛾外生殖器的抱器瓣宽而长，有冠刺，抱器腹延长。

种 检 索 表

1. 前翅白色布铜绿点 络夜蛾 *Neurois nigroviridis*
前翅非白色 2
2. 前翅绿色带褐 绿络夜蛾 *N. atrovirens*
前翅黑褐色，环纹后一白点 铜褐络夜蛾 *N. renalba*

绿络夜蛾 *Neurois atrovirens* (Walker) (图版 XVI-38)

Diphthera atrovirens Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 614. (大吉岭)

Neurois atrovirens: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 611—Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 63, pl. 8d.—Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.202.

翅展 36mm。头部黑色；胸部及前翅黑褐色，后者有褐绿色调，基线、内线及外线均黑色衬浅红褐色，基、内线波浪形，外线锯齿形，环纹斜方形，肾纹长 8 字形，亚端线浅红褐色，锯齿形；后翅铜褐色；腹部褐色。

分布 西藏；锡金，不丹，印度，缅甸。

络夜蛾 *Neurois nigroviridis* (Walker) (图版 XVI-39)

Diphthera nigroviridis Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 615. (大吉岭)

Neurois nigroviridis: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 610.—Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 63.

翅展 31mm。头、胸白色杂黑褐色；前翅白色，密布褐绿细点，端区红褐色，基线、内线、中线及外线均黑色，除中线外均衬以白色，环、肾纹白色黑边，中有铜绿色纹，亚端线内侧有黑齿纹；后翅及腹部黑褐色。

分布 四川、西藏；锡金。

铜褐络夜蛾 *Neurois renalba* (Moore) (图版 XVII-1)

Mamestra renalba Moore, 1882, Lep. Atk. p. 111. (大吉岭)