

## 络夜蛾属 *Neurois* Hampson

*Neurois* Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 610.

Type-species: *Diphtera nigroviridis* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，前缘饰毛，额斜圆，端部粗糙，微突，雄蛾触角线形，前足胫节无刺，中、后足胫节具刺，前足胫节长于跗基节，后胸有背毛簇，前翅有一副室。雄蛾外生殖器的抱器瓣宽而长，有冠刺，抱器腹延长。

### 种 检 索 表

1. 前翅白色布铜绿点 ..... 络夜蛾 *Neurois nigroviridis*  
    前翅非白色 ..... 2
2. 前翅绿色带褐 ..... 绿络夜蛾 *N. atrovirens*  
    前翅黑褐色，环纹后一白点 ..... 铜褐络夜蛾 *N. renalba*

### 绿络夜蛾 *Neurois atrovirens* (Walker) (图版 XVI-38)

*Diphtera atrovirens* Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 614. (大吉岭)

*Neurois atrovirens*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 611—Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 63, pl. 8d.—Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.202.

翅展 36mm。头部黑色；胸部及前翅黑褐色，后者有褐绿色调，基线、内线及外线均黑色衬浅红褐色，基、内线波浪形，外线锯齿形，环纹斜方形，肾纹长 8 字形，亚端线浅红褐色，锯齿形；后翅铜褐色；腹部褐色。

分布 西藏；锡金，不丹，印度，缅甸。

### 络夜蛾 *Neurois nigroviridis* (Walker) (图版 XVI-39)

*Diphtera nigroviridis* Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 615. (大吉岭)

*Neurois nigroviridis*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 610.—Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 63.

翅展 31mm。头、胸白色杂黑褐色；前翅白色，密布褐绿细点，端区红褐色，基线、内线、中线及外线均黑色，除中线外均衬以白色，环、肾纹白色黑边，中有铜绿色纹，亚端线内侧有黑齿纹；后翅及腹部黑褐色。

分布 四川、西藏；锡金。

### 铜褐络夜蛾 *Neurois renalba* (Moore) (图版 XVII-1)

*Mamestra renalba* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 111. (大吉岭)

*Neurois renalba*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 612, pl. 76, fig. 21. —  
Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 290.

翅展 35mm。头部黑棕色杂白色；胸部黑褐杂浅褐色；前翅铜褐色，布有细黑点，内线内方黑点致密，基线浅褐色，内线、中线及外线黑色，后者锯齿形，前端外侧衬白，环纹不明显，肾纹大，约呈 8 字形，有白点，亚端线黄褐色锯齿形，内侧一列黑齿纹；后翅浅褐色；腹部褐色。

分布 西藏；锡金。

## 翼夜蛾属 *Trichanarta* Hampson

*Trichanarta* Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 507.

Type-species: *Anarta ladakensis* Felder et Rogenhofer.

*Ala* Staudinger, 1882, Stett. ent. Schmett. 43: 49.

喙发达，下唇须向前平伸，下缘饰长毛，第三节长而尖，复眼大，圆形，眼面有纤毛，触角线形或锯齿形，额有一大毛簇；胸部被粗毛及鳞片，中、后足胫节具刺；前翅有一副室；后翅 5 脉细弱。

### 种 检 索 表

- 前翅中区有暗影 ..... 绣翼夜蛾 *Trichanarta picteti*  
前翅中区无暗影 ..... 珍翼夜蛾 *T. pretiosa*

#### 绣翼夜蛾 *Trichanarta picteti* (Staudinger) (图版 XVII-2)

*Ala picteti* Staudinger, 1882, Stett. ent. Z. 43: 49. (吉尔吉斯)

*Ala picteti* Staudinger, Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 11, text fig. 3. —  
Kozhantschikov, 1947, Rev. ent. URSS. 1—2, fig.

*Anarta picteti*: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 250, pl. 50a.

*Trichanarta picteti*: Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 278, pl. 84, fig. 1986.

翅展 23mm 左右。头部及胸部黑色杂以白色，复眼有毛；前翅淡褐灰色，布有黑色细点，后缘较黑，基线黑色外弯至亚中褶，内线黑色，外弯，剑纹大，黑色，环纹扁，黑色，其前方有一黑斑位于前缘脉，肾纹褐灰色，黑边，后端沿中脉内突，外线灰色外弯，亚端线灰色，前端内侧有一黑云状纹，缘毛端部白色；后翅白色，翅脉及后缘黑色，外缘有一黑宽带，缘毛白色；腹部黑色。

分布 新疆；中亚地区。

#### 珍翼夜蛾 *Trichanarta pretiosa* (Alpheraky) (图版 XVII-3)

*Ala pretiosa* Alpheraky, 1892, Hor. Soc. enr. ross. 26: 453. (Amdo 地区, Njan-schan 山脉)