

Manobia Staudinger, 1895, *Iris*, 8: 317.

喙发达，下唇须向上伸，前缘饰毛，额平滑无突起，眼大，圆球形，雄蛾触角微锯齿形；头部与胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇，前足跗节外侧有弯爪；腹部基节背面有毛簇；前翅有一副室。

尼夜蛾 *Niaboma xena* (Staudinger) (图版XIX-25)

Manobia xena Staudinger, 1895, *Iris* 8: 317, pl. 6, fig. 8. (青海湖与罗布泊之间)

Manobia xena: Hampson, 1905, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 5: 276. —Warren, 1910, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 84.

Niaboma xena: Chen *et al.*, 1991, *Noct. Fn. Xizang* p.187.

体长 16 mm；翅展 36 mm。头部与胸部褐色杂紫灰色；前翅褐色带紫灰色，部分带有赤褐色，内线与外线之间大部色暗，基线黑褐色，波浪形，自前缘脉至 1 脉，中室基部后方有一黑色三角形纹，内线黑色，内侧衬灰色，在前缘脉后折角外斜，至 1 脉折向内斜，剑纹小，隐约可见黑褐色边，环纹大，圆形，浅褐色，外围灰色，褐边，肾纹大，内外缘中凹，后端稍内凸，色似环纹，外线双线黑色，线间灰色，锯齿形，自前缘脉后外弯，4 脉后内斜，亚端线灰色，两侧衬黑褐色，微波浪形，在 7 脉处外凸，在 3、4 脉处呈锯齿形，端线细，黑色，波浪形；后翅淡褐色，翅脉及端线黑褐色，缘毛褐白色；腹部灰褐色，毛簇赤褐色。

分布 青海、西藏。

秘夜蛾属 *Mythimna* Ochsenheimer

Mythimna Ochsenheimer, 1816, *Schmett. Eur.* 4: 78.

Type-species: *Phalaena turca* Linnaeus.

Philostola Billberg, 1820, *Enum. Ins. Mus. Billbg.* p. 87.

Mithimna Sidoffsky, 1837, *Bull. Soc. Natur. Mosc.* 10 (6): 87.

Hyperiodes Warren, 1910, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 94.

喙发达，下唇须第二节斜向上伸，前方饰毛，第三节一般或稍长，外伸；额平滑，复眼大，圆形；胸部毛鳞混杂，无明显毛簇；腹部无毛簇；前翅稍宽，外缘较直，顶角较圆。

种检索表

1. 雄蛾后足胫节饰长毛 秘夜蛾 *Mythimna turca*
- 雄蛾后足胫节饰毛中常 2
2. 前翅内线斜 曲线秘夜蛾 *M. divergens*