

洼皮夜蛾属 *Nolathripa* Inoue

Nolathripa Inoue, 1970, Bull. Jap. ent. Acad. 5: 38.

Type-species: *Nola lactaria* Graeser.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节稍长，额平滑，有毛簇，复眼圆大，有长睫毛，雄蛾触角线形，有纤毛；胸部有毛和毛状鳞，翅基片有鳞片，端部膨大，后胸有散开型大毛簇；前足胫节外侧饰毛较宽；腹部基部几节有毛簇，第一及三节上的较大；前翅翅尖圆形，外缘曲度平稳，不成锯齿形，臀角有鳞齿，有副室；后翅中室约为翅长之半。

洼皮夜蛾 *Nolathripa lactaria* (Graeser) (图版 XLV-3)

Nola lactaria Graeser, 1892, Berl. ent. Z. 37: 211. (Ussuri, Koslofska)

Dialithoptera stellata Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 193.

Lamprothripa lactaria: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 288. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 339.

Nolathripa lactaria: Inoue, 1979, Bull. Jap. ent. Acad. 5 (2): pl. 1: 3; pl. 2: 6.




图 593 洼皮夜蛾 *Nolathripa lactaria* (Graeser) ♂ 外生殖器

翅展 21—30mm。头、胸及前翅内半白色；前翅外半暗褐色，中室基部一簇白竖鳞，端部一黑纹达前缘脉，外线黑色，有银色鳞簇，亚端线浅褐色波浪形，内侧衬黑色，端线黑色；后翅白色，端区浅褐色；腹部浅褐间白色，基节白色。雄蛾抱器瓣长，端部微分支，右瓣有腹端突（图 593）。

寄主 苹果、枇杷。

分布 黑龙江、河北、陕西、湖南、江西、海南、四川；俄罗斯。