

Staurophora celsia: Forster et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 148. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 313. —Varga, 1982, Folia ent. Hung. 43 (1): 217.

翅展 40 mm。头部粉绿色，下唇须第一、二节褐色；胸部粉绿色，颈板端部及翅基片边缘褐色，后胸毛簇褐色；前翅粉绿色，中部有一树干形褐色带，在中室明显向两侧突出成锯齿形，在 1 脉后渐宽，翅基部有一棕褐色斑，顶角、中褐端部及臀角各有一褐色三角形斑，翅外缘及缘毛棕色；后翅棕褐色，缘毛端部白色；腹部黄褐色。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆、河北、山东；欧洲。

窄干纹夜蛾 *Staurophora tenuis* (Warren) (图版 XXXVII - 10)

Calotaenia tenuis Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 130. (青海湖)

Calotaenia tenuis: Draudt, 1934, ibid. Suppl. p. 138. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 313.

翅展 40 mm。头部与胸部粉绿色，颈板与翅基片边缘棕色，胸背毛簇深棕色；前翅粉绿色，中区有一棕褐色带，自前缘脉至中室约呈斜条状，其后中断，自中室后至翅后缘约呈树杈状，后端渐宽，翅基部有一棕褐色斑，顶角、中褶端部及臀角处各有一褐色近三角形斑，翅外缘及缘毛棕色；后翅褐色；腹部灰褐色。

分布 青海。

杆夜蛾属 *Nonagria* Ochsenheimer

Nonagria Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 82.

Type-species: *Nonagria typhae* Thunberg.

Enteriona Sodoffsky, 1837, Bull. Soc. imp. Nat. Mosc. 6: 87.

Conicophoria Matsumura, 1929, Ins. Mats. 3: 118.

喙退化，短缩，下唇须向前平伸，下缘饰长毛，额有丘形突，复眼大，触角有双栉形、锯齿形或线形；前、后胸有毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉弱，6、7 脉共柄。

种 检 索 表

有肾纹	香蒲杆夜蛾 <i>Nonagria puengeleri</i>
无肾纹	污杆夜蛾 <i>N. turpis</i>

香蒲杆夜蛾 *Nonagria puengeleri* (Schawerda) (图版 XXXVII - 11)

Sidemia? pungelei Schawerda, 1924, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 73: 89. (西伯利亚)

Sidemia pungelei: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 162.

Archana puengeleri: Heydemann et al., 1963, Mitt. munch. ent. Ges. 53: 107.

Nonagria puengeleri: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 750.

翅展 40—52 mm。头、胸及前翅褐色，前翅翅膀黑褐色杂有灰白色，中室前缘及亚前缘脉、前缘脉仅微带黑褐色布有少许白点，各横线不显，肾纹仅在中室下角现一白点，其周围有些黑褐鳞，亚端区、端区的各翅膀间带有黑褐毛，缘毛暗褐色，杂有少许白色；后翅黄白色，亚端区与端区的翅膀带有白色并布有黑褐色，端区的黑褐点稍扩散至翅膀前后，缘毛黄白色杂有黑褐色，2脉后的缘毛及翅膀无黑褐点；腹部黄白色。

寄主 香蒲。

分布 黑龙江；亚洲西部，俄罗斯。

污杆夜蛾 *Nonagria turpis* Butler (图版 XXXVII - 12)

Nonagria turpis Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 4: 359. (日本横滨)

Phragmatiphila turpis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 272.

Nonagria turpis: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 750.

翅展 28—36 mm。头、胸及前翅浅赭黄色，前翅带赤褐色，中室后半至亚中褶有一黑褐纵纹并扩展至 2—4 脉间，各横线不明显，内线黑褐色锯齿形，中室端有一褐黑小斑，外线黑色，前半为点列，亚端线为一列黑点，6—8 脉间的点楔形，顶角一内斜黑褐纹，翅外缘一列黑点；后翅浅赭黄色；腹部赭白色带褐色。

分布 湖北；日本，朝鲜。

多型种。个体变异多样。

蛀茎夜蛾属 *Sesamia* Guenée

Sesamia Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 95.

Type species: *Cossus nonagrioides* Lefebvre.

Microsemyra Butler, 1883, Proc. zool. Soc. p. 155.

喙退化，很小，下唇须向上伸，第二节约达额中部，前方有长毛，第三节短，额平滑，具毛簇，复眼大，圆形；雄蛾触角双栉形，端节短；胸部仅有毛，无毛簇；胫节有长毛；腹部有粗毛而无毛簇；前翅顶角钝，外缘曲度平稳，不成锯齿形。

种 检 索 表

1. 雄蛾触线形 蕉蛀茎夜蛾 *Sesamia uniformis*
- 雄蛾触角双栉形 2
2. 雄蛾触角双栉齿达端部 蛀茎夜蛾 *S. nonagrioides*
- 雄蛾触角基 2/3 双栉，端部锯齿形 稻蛀茎夜蛾 *S. inferens*

蛀茎夜蛾 *Sesamia nonagrioides* (Lefebvre) (图版 XXXVII - 13)

Cossus nonagrioides Lefebvre, 1827, Ann. Soc. Linn. Paris, 6: 98. (意大利)