

小，端部裂口极浅；抱器腹端突短小。阳茎短小，阳茎盲囊较阳茎体细。

检视标本：1 ♂，西藏拉米格日，1986. IV. 12。

分布：西藏；尼泊尔。

备考：Prout (1958) 曾记述本种的一个亚种 *subsp. tsangpoensis* (Prout)，产于西藏东南部，前翅斑纹色深且更清晰，浅色亚缘线更加鲜明，后翅基半部白色。仅发现 1 ♂ (正模)，保存在英国自然历史博物馆。

点脉伪沼尺蛾 *Nothocasis neurogrammata* (Püngeler, 1908) (图版Ⅲ：24)

Lobophora neurogrammata Püngeler, 1908, Dt. ent. Z. Iris 21: 296. (青海：库库诺尔)

Acasis neurogrammata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 182.

Nothocasis neurogrammata: Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 452.

前翅长：♂ 18 mm，♀ 20 mm。下唇须短小，尖端伸达额外，♀ 较 ♂ 略长，黑褐色。头和体背灰黄色，头胸部掺杂黑褐色。额鳞毛粗糙。前翅浅灰褐色，略带灰红色调，翅脉上点缀长短不等的黑褐色点或条纹；外线波曲，深褐色，其外侧无清晰边缘，内侧为一条灰白色狭窄中带；中点黑色，外线在中点外侧内凹并与中点接触；亚缘线浅波状，其内侧有一条深色波线，均极模糊；缘线消失，缘毛灰白色，在翅脉端深灰褐色。后翅污白色；亚缘线深色，细弱模糊；缘毛同前翅。前翅反面浅灰褐色，隐见外线；后翅反面较正面色浅。翅缰几乎完全退化。

雄性外生殖器 (图 174)：囊形突半圆形。抱器瓣端部宽大；抱器背延长；抱器端裂口深度略大于抱器背长的 1/3，宽阔；抱器腹端突发达。阳茎较前种长大，阳茎盲囊较阳茎体粗。

雌性外生殖器 (图 177)：囊导管上端骨化呈杯状，其下至囊颈处渐粗，囊颈处骨化并具微刺。囊体小，袋状，膜质无刺。

检视标本：1 ♂ 1 ♀，甘肃永登连城林场，2 200 m，1987. VII—IX。

分布：甘肃、青海。

灰带伪沼尺蛾 *Nothocasis grisefasciaria* Xue, 1992 (图版Ⅲ：25)

Nothocasis grisefasciaria Xue, 1992, Sinozoologia 9: 289, fig. 15: c, pl. 2: 43. (甘肃：永登)

前翅长：♀ 16—17 mm。外观近似点脉伪沼尺蛾。下唇须较长，♀ 约 1/2 伸出额外。前翅灰红色调明显，翅脉上的黑点大部消失，浅色中带较鲜明，其内侧边缘 (中线) 清晰；中点微小，外线在中点外侧无明显内凹，远离中点。前翅第一、二径副室间横脉十分细弱。翅缰略有退化。

雌性外生殖器 (图 178)：囊导管短于囊体直径，中下部局部骨化并有小刺。囊体近圆球形，除左侧和底部外散布大小不均的小刺，刺较稀疏。

检视标本：2♀（正模和副模），甘肃永登连城林场，2 200 m，1987. V。

分布：甘肃。

川伪沼尺蛾 *Nothocasis octobris* Prout, 1958

Nothocasis octobris Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 452, fig. 42. (四川)




图 175—176 雄性外生殖器. 175. 川伪沼尺蛾 *Nothocasis octobris* Prout;
176. 苔伪沼尺蛾 *N. muscigera* (Butler)

前翅长：♂约 20 mm。下唇须黑色，♂尖端伸达额外，♀约 1/3 伸出额外。头和体背灰白色掺杂黑褐或深褐色。前翅浅灰褐色；亚基线黑色；中线和外线形成两条深色带，在前后缘形成黑斑，在翅脉上有黑点；外线在中室端外侧向外凸出；中点黑色清晰；亚缘线外侧翅脉上的黑纹和缘线在翅脉端两侧的黑点清晰。后翅灰白色，翅端部色略深，有一条弧形深色线。♂后翅 R_s 不与 M_1 共柄。翅缰极短小，但存在。

雄性外生殖器（图 175）：近似点脉伪沼尺蛾（图 174）。钩形突较细长。囊形突较狭小。抱器瓣端部不特别宽阔，裂口深约为抱器背长的 1/3 强，上片宽阔，下片尖狭；抱器腹端突短粗。阳茎细小。

检视标本：1 ♂，西藏拉米格日，3 180 m，1986. IX. 12。

分布：四川、西藏。

备考：手头西藏标本 1 ♂两前翅折断，但特征符合 Prout (1958) 原记，鉴定为本种。上文描述结合 Prout 原描述及图整理。