

检视标本：2♀（正模和副模），甘肃永登连城林场，2 200 m，1987. V。

分布：甘肃。

川伪沼尺蛾 *Nothocasis octobris* Prout, 1958

Nothocasis octobris Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 452, fig. 42. (四川)




图 175—176 雄性外生殖器. 175. 川伪沼尺蛾 *Nothocasis octobris* Prout;
176. 苔伪沼尺蛾 *N. muscigera* (Butler)

前翅长：♂约 20 mm。下唇须黑色，♂尖端伸达额外，♀约 1/3 伸出额外。头和体背灰白色掺杂黑褐或深褐色。前翅浅灰褐色；亚基线黑色；中线和外线形成两条深色带，在前后缘形成黑斑，在翅脉上有黑点；外线在中室端外侧向外凸出；中点黑色清晰；亚缘线外侧翅脉上的黑纹和缘线在翅脉端两侧的黑点清晰。后翅灰白色，翅端部色略深，有一条弧形深色线。♂后翅 R_s 不与 M_1 共柄。翅缰极短小，但存在。

雄性外生殖器（图 175）：近似点脉伪沼尺蛾（图 174）。钩形突较细长。囊形突较狭小。抱器瓣端部不特别宽阔，裂口深约为抱器背长的 1/3 强，上片宽阔，下片尖狭；抱器腹端突短粗。阳茎细小。

检视标本：1 ♂，西藏拉米格日，3 180 m，1986. IX. 12。

分布：四川、西藏。

备考：手头西藏标本 1 ♂两前翅折断，但特征符合 Prout (1958) 原记，鉴定为本种。上文描述结合 Prout 原描述及图整理。