

- 麻伪沼尺蛾 *N. polystictaria*
前翅浅灰色，略带灰红色调，浅色亚缘线模糊不清，其内侧无上述深色双线及黑色尖齿
..... 点脉伪沼尺蛾 *N. neurogrammata*

麻伪沼尺蛾 *Nothocasis polystictaria* (Hampson, 1903) (图版Ⅲ：23)

Trichopteryx polystictaria Hampson, 1903, J. Bombay nat. Hist. Soc. 14: 645. (西藏)

Nothocasis polystictaria: Herbulot, 1984, Miscellanea ent. 50: 42, fig. 5.




图 173—174 雄性外生殖器. 173. 麻伪沼尺蛾 *Nothocasis polystictaria* (Hampson);
174. 点脉伪沼尺蛾 *N. neurogrammata* (Püngeler)

前翅长：♂ 17 mm。下唇须短小，尖端伸达额下，黑褐色，尖端及第一节腹面掺杂黄色。头和前胸黄白至黄色，中后胸黄白色与深褐至黑褐色掺杂。前翅浅灰黄色，带灰绿色调，线纹在前缘留下一列黑点，其下方至中室前缘均断离；亚基线由中室前缘至翅后缘直且粗壮，黑色，下端沿后缘向外扩展；内线两条，互相接触，黑褐色与褐色相间；翅中部以外各翅脉上点缀小黑点；由中线和外线组成的中带狭窄且不完整，褐色与黑褐色掺杂，在后缘形成一较大黑斑；亚缘线浅色波状，其内侧有两条深灰褐色细线，并在 M 脉之间形成两个外凸的尖齿；缘线在各翅脉端两侧有一对黑点；缘毛白色，在翅脉端黑褐色。后翅灰白色；中点深灰色褐色，微小但清晰；翅端半部点缀深灰褐色点；缘毛在翅脉端掺杂黑褐色。前翅反面灰褐色至浅灰褐色，隐见正面斑纹，有微小黑褐色中点；后翅反面颜色较正面略深，翅脉点较模糊。翅缰完全退化。

雄性外生殖器 (图 173)：钩形突细长刺状。囊形突延长呈舌状。抱器瓣宽度变化

小，端部裂口极浅；抱器腹端突短小。阳茎短小，阳茎盲囊较阳茎体细。

检视标本：1 ♂，西藏拉米格日，1986. IV. 12。

分布：西藏；尼泊尔。

备考：Prout (1958) 曾记述本种的一个亚种 *subsp. tsangpoensis* (Prout)，产于西藏东南部，前翅斑纹色深且更清晰，浅色亚缘线更加鲜明，后翅基半部白色。仅发现 1 ♂ (正模)，保存在英国自然历史博物馆。

点脉伪沼尺蛾 *Nothocasis neurogrammata* (Püngeler, 1908) (图版Ⅲ：24)

Lobophora neurogrammata Püngeler, 1908, Dt. ent. Z. Iris 21: 296. (青海：库库诺尔)

Acasis neurogrammata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 182.

Nothocasis neurogrammata: Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 452.

前翅长：♂ 18 mm，♀ 20 mm。下唇须短小，尖端伸达额外，♀ 较♂ 略长，黑褐色。头和体背灰黄色，头胸部掺杂黑褐色。额鳞毛粗糙。前翅浅灰褐色，略带灰红色调，翅脉上点缀长短不等的黑褐色点或条纹；外线波曲，深褐色，其外侧无清晰边缘，内侧为一条灰白色狭窄中带；中点黑色，外线在中点外侧内凹并与中点接触；亚缘线浅波状，其内侧有一条深色波线，均极模糊；缘线消失，缘毛灰白色，在翅脉端深灰褐色。后翅污白色；亚缘线深色，细弱模糊；缘毛同前翅。前翅反面浅灰褐色，隐见外线；后翅反面较正面色浅。翅缰几乎完全退化。

雄性外生殖器 (图 174)：囊形突半圆形。抱器瓣端部宽大；抱器背延长；抱器端裂口深度略大于抱器背长的 1/3，宽阔；抱器腹端突发达。阳茎较前种长大，阳茎盲囊较阳茎体粗。

雌性外生殖器 (图 177)：囊导管上端骨化呈杯状，其下至囊颈处渐粗，囊颈处骨化并具微刺。囊体小，袋状，膜质无刺。

检视标本：1 ♂ 1 ♀，甘肃永登连城林场，2 200 m，1987. VII—IX。

分布：甘肃、青海。

灰带伪沼尺蛾 *Nothocasis grisefasciaria* Xue, 1992 (图版Ⅲ：25)

Nothocasis grisefasciaria Xue, 1992, Sinozoologia 9: 289, fig. 15: c, pl. 2: 43. (甘肃：永登)

前翅长：♀ 16—17 mm。外观近似点脉伪沼尺蛾。下唇须较长，♀ 约 1/2 伸出额外。前翅灰红色调明显，翅脉上的黑点大部消失，浅色中带较鲜明，其内侧边缘 (中线) 清晰；中点微小，外线在中点外侧无明显内凹，远离中点。前翅第一、二径副室间横脉十分细弱。翅缰略有退化。

雌性外生殖器 (图 178)：囊导管短于囊体直径，中下部局部骨化并有小刺。囊体近圆球形，除左侧和底部外散布大小不均的小刺，刺较稀疏。