

芒胫夜蛾属 *Nyssocnemis* Lederer

Nyssocnemis Lederer, 1857, Noct. Eur. p. 35, 117.

Type-species: *Hadena eversmanni* Lederer.

喙发达，下唇须向上伸，约达头顶，第二、三节前缘饰长毛，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角双栉形，栉齿长，雌蛾触角双栉形，栉齿短，端部为一鬃，前、后胸有散开型毛簇，各足胫节均具刺，前翅短宽，有一副室，后翅5脉细弱。

芒胫夜蛾 *Nyssocnemis eversmanni* (Lederer) (图版 XII-32)

Hadena eversmanni Lederer, 1853, Zool.-bot. Ver. p. 369, pl. 4, fig. 1. (E. Siberia)

Noctua obesa Eversmann, 1847, Bull. Soc. Imp. Mosc. 3: 86.

Nyssocnemis obesa: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 513. Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 56.

Nyssocnemis eversmanni: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 287, pl. 86, fig. 2044.

翅展44mm。头部与胸部黑棕色，杂有少许灰色及黑色，足跗节各节间有黄白斑；前翅灰棕色带紫色，基线双线黑色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，线间微白，内线双线黑色，在前缘脉后外凸，其后外斜，在1脉后外弯，剑纹黑边，环纹斜圆形，黑边，前方有一黑色外斜纹，肾纹白色，中有黑褐圈，内外侧黑色并稍扩展，中线黑棕色，波浪形，外线黑色，锯齿形，外侧衬黄色，自前缘脉后外弯至4脉后明显内弯，亚端线赭黄色，内侧微衬黑色，在7脉处外凸，中段外弯并微呈波浪形，端线由一列黑点组成；后翅浅黄色，外线黑褐色，端区黑褐色，成一宽带，在臀角处窄尖；腹部灰褐色。

分布 黑龙江、新疆、河北；西伯利亚。

烈夜蛾属 *Lycophotia* Hübner

Lycophotia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 215.

Type-species: *Noctua porphyrea* [Denis et Schiffermüller].

Scotophila Stephens, 1829, Nom. Brit. Ins. p. 41.

喙发达，下唇须前缘饰毛，额光滑，雄蛾触角线形，锯齿形或双栉形，各足胫节具刺，雄蛾外生殖器的抱器瓣宽，端部不规则成二叉，抱钩短钝或不明显。

种 检 索 表

前翅斑纹明显	烈夜蛾 <i>Lycophotia porphyrea</i>
前翅斑纹不显	简烈夜蛾 <i>L. simplicia</i>