

臀毛簇带有赭色。

分布 黑龙江；西伯利亚。

黑地狼夜蛾 *Ochropleura fennica* (Tauscher) (图版IX-22)

Noctua fennica Tauscher, 1806, Mem. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1: 210. (俄罗斯)

Ochropleura fennica: Zolotarenko, 1970, Cutworms W. Sib. p. 293, fig. 101. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 54, text fig. 28.

翅展 38 mm。头、胸黑色杂灰色；前翅紫棕色，大部带黑色，后缘区较褐红，基线、内线及外线均双线黑色，剑纹梭形，环、肾纹白色黑边，亚端线黑色，内侧一列齿形黑纹，在4—6脉间的呈楔形；后翅白色半透明，微带褐色，翅脉及端区色暗；腹部浅灰褐色。雄蛾抱钩指状，阳茎粗壮，近端部有一几丁质小环，其上有锯齿，内囊有短棘形角状器（图116）。




图 116 黑地狼夜蛾 *Ochropleura fennica*
(Tauscher) ♂外生殖器

分布 黑龙江、内蒙古、新疆；欧洲，北美洲。

漠狼夜蛾 *Ochropleura eremopsis* Boursin (图版IX-23)

Ochropleura (Dichagyris) eremopsis Boursin, 1948, Z. Wien. ent. Ges. 33: 101, pl. 1, figs. 5, 6; 7 male genitalia. (新疆库尔勒)

Ochropleura eremopsis: Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 66.

翅展 37 mm。头、胸、腹及前翅浅灰褐色，前翅亚端线外的各横线均黑色，基线、内线及外线均锯齿形，剑纹只现一黑点，环、肾纹之间黑色，前者小，后者不清晰，亚端线锯齿形，内侧一模糊黑褐曲带；后翅浅灰褐色，端区色暗。雄蛾抱钩微弯，指状，