

色，微波曲外斜，环纹与肾纹隐约可见暗褐边，外线黑褐色，锯齿形，端线由一列扁三角形黑纹组成；后翅白色，翅脉及端线浅褐色；腹部灰褐色。

分布 新疆；中亚地区，亚洲西部，欧洲。

焰色狼夜蛾 *Ochropleura flammata* (Denis et Schiffermüller) (图版IX-19)

Noctua flammata [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 80. (奥地利)

Ochropleura flammata: Forster & Wlhlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 21. ——Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 49, text fig. 24.

翅展 42 mm。头、胸及前翅褐灰色，后者前缘区大部及部分中室灰色，亚中褶基部一黑纵纹，基线、内线及外线均双线黑色，剑纹三角形，环、肾纹灰色，前者半圆形，一黑纹自前端内伸，中线黑褐色，亚端线浅灰，内侧有一列黑齿纹；后翅黄白色带褐色；腹部灰褐色。雄蛾抱钩粗棘形，阳茎无角状器（图 114）。




图 114 焰色狼夜蛾 *Ochropleura flammata*
(Denis et Schiffermüller) ♂外生殖器

寄主 蒲公英、草莓等。

分布 新疆、福建、西藏；印度，亚洲西部，欧洲。

赫狼夜蛾 *Ochropleura herculea* (Corti et Draudt) (图版IX-20)

Rhyacia flammata form *herculea* Corti et Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 64, pl. 8e. (“East Asia?”)

Ochropleura herculea: Boursin, 1964, Ver. zool. Staat. munch. 8: 13. ——Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 50, text fig. 25.

翅展 54 mm。头、胸及腹部褐灰色；前翅灰褐色，前缘区大部灰色，基中褶基部一近三角形黑纹，基线、内线及外线均双线黑色，各双线间均灰色，剑纹长舌形，环纹半圆形，灰白色，肾纹灰黑色，两纹间黑色，亚端线黄灰色，锯齿形；后翅浅褐色。雄蛾抱钩似指状，微弯，阳茎端部有一短棘形角状器（图 115）。




图 115 赫狼夜蛾 *Ochropleura herculea*
(Corti et Draudt) ♂ 外生殖器

分布 西藏；尼泊尔。

孽狼夜蛾 *Ochropleura nigrita* (Graeser) (图版IX-21)

Agrotis nigrita Graeser, 1892, Berl. ent. Zeit. p. 217. (SE Siberia: Pokrofska)

Rhyacia tzygankovi Kozhantschikov, 1926, Jahrb. Martj. Staats. 4: 80.

Euxoa nigrita: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 278. — Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 32.

Agrotis nigrita: Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR. 13: 489.

Ochropleura nigrita: Kovacs & Varga, 1973, Folia ent. Hung. 26 (2): 316.

Trichosilia nigrita: Lafontaine & Kononenko, 1986, Can. Entomologist 118 (11): 1085.

翅展 38 mm。头部与胸部黑褐色杂有灰色，翅基片与后胸背面紫红色，足跗节各节间有灰白斑；前翅黑褐色带有紫色，基线双线黑色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，线间微红，内线黑色，波浪形外斜，剑纹不明显，黑边，环纹圆形，较大，黑边，前缘开放，肾纹大，黑边，环纹与肾纹间的中室黑色，中线隐约可见，黑色，自中室下角至翅后缘，外线黑色，自前缘脉后外弯，至 4 脉后内弯，亚端线浅灰色，在 7 脉处外凸，中段外弯，内侧有一列黑色锯齿形纹；后翅黑褐色；腹部灰色杂灰黑色，背面微带紫色，