

胡狼夜蛾 *Ochropleura improba* (Staudinger) (图版IX-5)

Agrotis improba Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. p. 8. (撒马尔罕)

Ochropleura (Dichagyris) improba: Boursin, 1961, Beitr. nat. Frsch. SW.-Dtsch. 19: 378.

翅展 36 mm。头、胸、腹及前翅褐杂灰色，前翅基线与内线前段为黑纹，亚中褶一黑纵纹，剑纹长，环、肾纹白色黑边，后者后端稍内突，环纹后一黑纵线内伸，外线黑色，亚端线锯齿形，外侧黑褐色；后翅褐色。雄蛾抱钩斜向背伸，内突短小，阳茎有一乳突形角状器（图 105）。




图 105 胡狼夜蛾 *Ochropleura improba* (Staudinger) ♂外生殖器

分布 新疆；中亚地区。

列齿狼夜蛾 *Ochropleura multicuspis* (Eversmann) (图版IX-6)

Hadena multicuspis Eversmann, 1852, Bull. Mosc. p. 152. (乌拉尔)

Ochropleura multicuspis: Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR., 13: 441. ——Chen, 1982, Icon.

Het. Sin. 3: 293, pl. 88, fig. 2086.

翅展 40 mm。头、胸黄白色，头顶杂黑褐色，颈板有二黑弧线，胸背杂黑灰色；前翅灰白色带褐，中室、亚中褶及外线外侧黄白色，基线与内线仅前段明显，剑纹梭形，白色黑边，亚中褶基部一黑纵线，环、肾纹白色黑边，中线粗，外线黑色锯齿形，亚端线白色锯齿形，内侧一列黑齿纹；后翅白色带褐；腹部黄白带褐色。

分布 新疆；中亚地区，小亚细亚，欧洲。

摄狼夜蛾 *Ochropleura perturbans* Boursin (图版IX-7)

Ochropleura perturbans Boursin, 1948, Z. Wien. ent. Ges. 33: 103, pl. 1, fig. 8; pl. 5, fig.