

分布 新疆；中亚地区。

阿里狼夜蛾 *Ochropleura ngariensis* Chen (图版 X-2)

*Ochropleura ngariensis* Chen, 1982, Acta ent. Sin. 25 (2): 200, fig. 2. (西藏阿里)

翅展 33—35 mm。头、胸及前翅褐灰色，前翅布有细黑点，基线仅前端现一黑纹，内线黑色微锯齿形，环纹为一黑点，肾纹黑色，中有一灰黄弧纹，外线黑色锯齿形，中段外弯，亚端线隐约可见黑色锯齿形，端线由一系列三角形黑点组成，缘毛灰黄色；后翅黄白色，端区微带褐色；腹部灰黄色。雄蛾抱钩短肥，阳茎端膜有一短刺（图 121）。




图 121 阿里狼夜蛾 *Ochropleura ngariensis* Chen ♂ 外生殖器

分布 西藏。

黑剑狼夜蛾 *Ochropleura draesekei* (Corti) (图版 X-3)

*Lycophotia draesekei* Corti, 1928, Mitt. munch. ent. Ges. 18: 10, fig. 1. (北京附近的山脉)

*Rhyacia draesekei*: Corti et Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 77, pl. 11i.

*Ochropleura draesekei*: Boursin, 1963, Forsch. Ber. Lands Nordrhein-Westfalen 1170: 92. —

Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 51.

翅展 40 mm。头部白色带褐；胸部及前翅浅褐色，前翅布有细黑点，前、后缘区及端区黑点致密，基线、内线及外线均双线黑色，亚端线黄白色，内侧 2、4、8 脉处各有一黑齿纹，剑纹窄长，环纹大，肾纹长弯；后翅暗褐色；腹部灰褐色；雄蛾抱钩长，斜伸，端尖，阳茎有一短粗的锥形角状器（图 122）。

分布 黑龙江、吉林、河北。