

Rhyacia juldussi: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 50. —Corti & Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl.: 82. —Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR. 13: 436.

翅展 35 mm。头部与胸部紫红色，颈板中部有一灰白横线，端部褐色；前翅紫红色带褐色，前缘区大部赭色，基部赭色较宽展，基线仅在中室后现一褐斑，内线不明显，双线黑褐色，自中室后缘波曲外斜至翅后缘，环纹赭黄色，“V”形，中有黑褐细点，肾纹赭黄色杂黑褐色及灰色，环纹与肾纹间及环纹至内线均带黑褐色，中线黑褐色，较粗，自中室后波曲外斜至翅后缘 1 外线粗，黑褐色，自前缘脉外斜至 9 脉后稍外弯，7 脉后内斜，亚端线细弱，黑褐色，在 7 脉处稍外突，前段内侧黑褐色扩展至外线，端线黑褐色，各翅脉暗褐色，但外线内方的 10—12 脉色赭黄；后翅黑褐色，缘毛黄褐色；腹部黑褐色。

分布 新疆；中亚地区。

狼夜蛾 *Ochropleura plecta* (Linnaeus) (图版 IX-11)

Phalaena Noctua plecta Linnaeus, 1761, Fn. Suec. p. 221. (瑞典)

Ochropleura plecta: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 22. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.57, text fig. 30.

翅展 32 mm。头部浅褐色；胸部及前翅紫棕色，前翅前缘区基部灰白色，亚中褶基部一黑纵纹，内线白色，环、肾纹灰色，内线外方的中室黑色，外线黑色锯齿形，亚端线浅褐色锯齿形，外侧衬浅黑色；后翅白色，前缘区及顶角区带暗褐色；腹部浅褐灰色。雄蛾抱钩长，端部尖，阳茎长，有一粗长棘状角状器（图 109）。




图 109 狼夜蛾 *Ochropleura plecta* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

分布 黑龙江、青海、云南、西藏；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡，欧洲，北美洲。

昆狼夜蛾 *Ochropleura musivula* (Staudinger) (图版IX-12)

Agrotis musivula Staudinger, 1895, Iris, 8: 310. (青海湖与罗布泊之间)

Agrotis musivula: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 389.

Rhyacia musivula: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 43, pl. 9g.

Ochropleura musivula: Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR 13: 436. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 293, pl. 88, fig. 2085.

翅展 30 mm。头部与胸部灰褐色，微有紫色调，颈板基部淡褐色，端半部黑棕色；其下缘为一白色横线；前翅褐色微带紫色，外线内方的前缘区土黄色，端区色较淡，亚中褶基部有一黑斑，内线双线黑色，波浪形，仅中室后可见，环纹前端开放，后半部圆形，灰白色，中央黑色，肾纹黑色，其内缘白色，外缘不清晰，环纹内方有一黑色三角形斑，环纹与肾纹间的中室黑色，外线微黑，锯齿形，自前缘脉后外弯，至 4 脉后内弯，亚端线淡褐色，在 7 脉处外凸，中段外弯，线内侧有一列黑棕色齿形纹，前端黑棕色较扩展，端线由一系列黑点组成；后翅淡褐色，端线黑褐色，缘毛基部有一赭黄线，腹部灰褐色，腹面黑褐色。

分布 青海、新疆。

繆狼夜蛾 *Ochropleura musiva* (Hübner) (图版IX-13)

Noctua musiva Hübner, [1803], Eur. Schmett., Noct. pl. 25, fig. 118. (欧洲)




图 110 繆狼夜蛾 *Ochropleura musiva* (Hübner) ♂ 外生殖器