

基角狼夜蛾 *Ochropleura triangularis* Moore (图版IX-17)

Ochropleura triangularis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 55. (大吉岭)

Ochropleura triangularis: Boursin, 1963, Forsch. Ber. Lands Nordrhein-Westfalen 1170: 88. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p. 83.

翅展 36—46 mm。头、胸紫棕色；前翅紫黑色，前缘区大部及中室前缘黄白色，亚中褶基部一黑色三角形斑，环纹 V 形，黄白色，肾纹内缘一黄白线，两纹间黑色，内线与外线黑色，锯齿形，亚端线褐黄色锯齿形，内侧一列齿形黑点；后翅暗褐色。雄蛾抱钩粗长，指状（图 113）。




图 113 基角狼夜蛾 *Ochropleura triangularis*
Moore ♂ 外生殖器

分布 甘肃、四川、云南、西藏；日本，印度，克什米尔地区。

东狼夜蛾 *Ochropleura orientis* (Alpheraky) (图版IX-18)

Agrotis signifera var. *orientis* Alpheraky, 1882, Hor. Soc. ent. ross. 27: 54. (新疆伊宁)

Agrotis improba var. *improcera* Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 9.

Euxoa pygmaea Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 336.

Agrotis caroli Culot, 1911, Noct. et Geometr. Eur. 1: 80.

Euxoa signifera ab. *orientis*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 332. —Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 35.

Agrotis signifera orientis: Corti & Draudt, 1937, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 245.

Ogygia orientis: Kovacs & Varga, 1973, Folia ent. Hung. 26 (2): 312.

翅展 35 mm。头部与胸部灰色杂暗褐色，颈板中部有一黑色横线，翅基片边缘有黑点，足跗节有黑条；前翅褐灰色，亚中褶基部有一褐纵纹，各横线不明显，内线褐