

pl. 7f, h. (新疆)

*Ochropleura despecta*: Boursin, 1961, Beitr. nat. Forsch. SW.-Dtsch. 19: 378.

翅展 43 mm。头部与胸部浅黄灰色带浅褐；前翅黄灰色，基线仅在前缘区现一黑色三角形斑，内线在前缘区现一方形黑斑，在中室现一黑细纹，在亚中褶现一黑曲纹，环纹与肾纹不显，中线粗，黑色，在前缘区最粗，波浪形外斜至中室下角，折角内斜并渐模糊，外线不清晰，黑色，间断为点列，在中褶及亚中褶处较显，亚端线仅在 7 脉前可见一黑纹，翅外缘有一列新月形黑纹；后翅白色微带褐色；腹部浅褐色。雄蛾抱钩指形（图 119）。

分布 新疆。

### 灰褐狼夜蛾 *Ochropleura ignara* (Staudinger) (图版 IX-30)

*Agrotis ignara* Staudinger, 1896, Iris. 9: 248. (蒙古)

*Agrotis ignobilis* Staudinger, 1895, Iris. 8: 354.

*Agrotis ignara*: Zolotarenko, 1970, Cutworms W. Sib. p. 311, fig. 110. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 63.

翅展 36 mm。头、胸及前翅浅黄褐色，前翅布有黑褐细点，各横线黑色，基线、内线及外线均锯齿形，中线粗，亚端线后半不显，剑纹不清晰，无环、肾纹；后翅污褐色；腹部灰褐色。

分布 内蒙古、山西；蒙古，土耳其，欧洲。

### 垒狼夜蛾 *Ochropleura vallesiaca* (Boisduval) (图版 IX-31)

*Agrotis vallesiaca* Boisduval, [1837] 1834, Ic. Lepid. Eur. pl. 78, fig. 3. (欧洲)

*Rhyacia inexpectata* Kozhantschikov, 1925, Jahr. Martj. Staat. Min. 3: 75.

*Dichagyria vallesiaca*: Forster & Wlhlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 17. —Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR. 13: 410.

翅展 40 mm。头、胸赭白杂褐色及少许黑色；前翅浅赭黄色，密布细褐点，除亚端线外各横线均黑褐色，基线、内线及中线波浪形，外线锯齿形，剑纹外缘黑色，环纹小，肾纹黑边，亚端线褐白色，内侧衬黑色，在 3、4 脉处为锯齿形；后翅白色，端区带褐色；腹部黑褐色。

分布 新疆；中亚地区，欧洲。

### 实狼夜蛾 *Ochropleura spissilinea* (Staudinger) (图版 IX-32)

*Agrotis spissilinea* Staudinger, 1896, Iris, 9: 253. (蒙古)

*Agrotis spissa* Staudinger, 1895, Iris, 8: 357.

*Euxoa picturata* Kozhantschikov, 1925, Jahr. Martj. Staat. Min. 3: 72.