

后翅灰褐色缘毛色浅；腹部灰褐色。

分布 浙江、湖南、四川。

黄纹矢夜蛾 *Odontestra submarginalis* (Walker) (图版 XVIII-34)

Heliophobus submarginalis Walker, 1869, Char. Undescr. Het. p. 32. (未注明模式产地)

Odontestra submarginalis: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 207. ——Berio, 1964, Boll. Soc. ent. Ital. 94: 109. ——Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.183.

翅展 40mm。头、胸灰色杂暗褐及黑色；前翅紫灰带黑色并布有细黑点，中室基部及后方有黄色点，后缘有一赭黄纵条，基线、内线及外线均双线黑色，双线间均白色，内线波浪形，外线锯齿形，剑纹粗大，黑色，环、肾纹褐色，后者大，斜长方形，2脉基部后方有一剑形白纹，亚端线黄色，内侧一列齿形黑斑，顶角一黄斜纹；后翅褐色；腹部灰色带黑褐色。

分布 西藏；印度。

盗夜蛾属 *Hadena* Schrank

Hadena Schrank, 1802, Faun. Boica. p. 158.

Type-species: *Noctua capsincola* [Denis et Schiffermüller].

Miselia Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 72.

Zeteolyga Billberg, 1820, Enum. In. Mus. Billbg. p. 87.

Harmodia Hübner, [1820] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 207.

Epia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 214.

Dianthoecia Boisduval, 1834, Rev. Ent. 2: 246.

Adena Agassiz, [1874] 1846, Nom. zool. Index Univ. p. 170.

Enterpia Guenée, 1850, Ann. Soc. ent. Fr. 8: 235.

Anepia Hampson, 1918, Nov. zool. 25: 46.

Aneida Sukareva, 1973, Ent. Rev. 52: 410.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘有毛，第三节短，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角线形，有纤毛；胸部毛与鳞片混生，前胸一般有分裂的毛簇，下胸有长毛，胫节有长毛，腹部第一节背面有毛簇，基部有绒毛，两侧有毛；前翅稍窄，顶角尖形，外缘斜曲，缘毛锯齿形，有副室。雄蛾抱器瓣腹缘近端部常明显凹陷，瓣端缘多为钝圆形。

种 检 索 表

1. 雄蛾触角锯齿形 黄盗夜蛾 *Hadena luteage*
 雄蛾触角线形 2