

Type-species: *Odontodes aleuca* Guenée.

*Nedroma* Walker, 1869, in Chapman, Proc. nat. Hist. Soc. Glasgow 1: 353.

*Burdria* Walker, 1869, Characters undescr. Lep. Het. p. 50.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，额无突起，有毛簇，复眼圆大；雄蛾触角线形；胸部主要被鳞，无毛簇；腹部第一、三节有毛簇；前翅外缘微波浪形，臀角有鳞齿；后翅5脉自中室下角伸出。

### 齿蕊夜蛾 *Odontodes aleuca* Guenée (图版XLIII-3)

*Odontodes aleuca* Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 51. (East Indies)

*Nedroma ferruginea* Walker, 1869, Proc. N. H. Soc. Glasg. 1: 353.

*Odontodes aleuca*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 366. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 366. ——Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 91. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 336.

翅展34—36mm。头、胸及腹黑棕杂紫灰色；前翅棕色杂紫灰色，基线、内线深棕色，内线双线波浪形，环纹小，黑棕色，内缘触及内线，肾纹大，黑棕色，褐边，中线深棕色，波浪形，在中室后呈双线，环纹与肾纹之间有一白斑，外线双线黑棕色，锯齿形，自前缘脉后外弯，4脉后内弯，亚端线灰色，锯齿形，中段外弯，线外方灰色带褐色，端线由一列新月形黑点组成；后翅暗褐色，翅脉纹及端区色更浓。

分布 海南、西藏；锡金，印度，斯里兰卡，新加坡等。

### 蕊夜蛾属 *Stictoptera* Guenée

*Stictoptera* Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 7: 51.

Type-species: *Stictoptera cuculloides* Guenée.

*Dandaca* Walker, 1856, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 9: 137, 149.

*Minica* Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1122, 1139.

*Steiria* Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1122, 1135.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，端部稍膨大；额平滑，上缘有毛簇；复眼圆大；雄蛾触角长，有纤毛，基节内侧有毛簇；翅基片上缘有直立三角形毛簇，前胸有散开的毛簇，后胸有成对小毛簇，下胸有长毛；腹部第一、三节有毛簇，腹面基部有大鳞扇；前翅稍窄长，顶角较钝，外缘斜曲，锯齿形，有副室。

### 种 检 索 表

1. 前翅亚中褶近基部有一黑圆斑 ..... 丰蕊夜蛾 *Stictoptera repleta*