

白曲纹，后端黑色，外线由白点列成一前端的点大，其后列成锯齿形，内侧衬黑色，亚端线白色锯齿形；后翅烟褐色；腹部暗褐灰色。

分布 陕西、江苏、浙江、湖南、云南。

雍夜蛾 *Oederemia lithoplasta* Hampson (图版 XXXII-2)

Oederemia lithoplasta Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 406, text fig. 65. (乌兹别克)

Oederemia lithoplasta: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.49.

翅展 34mm。头、胸白色带褐色；前翅白色带黄褐色，布有细黑点，基线与内线黑色波浪形，后者内侧衬白，剑纹端缘黑色，环、肾纹白色，中线黑色锯齿形，外线双线黑色，外一线间断为点列，亚端线白色锯齿形，内侧有黑纹，翅外缘一系列黑点；后翅白色带污褐色，外线细，亚端线为带状，两线均褐色；腹部白色带褐色。

分布 西藏；中亚地区。

小雍夜蛾 *Oederemia nanata* Draudt (图版 XXXII-3)

Oederemia nanata Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 18, pl. 3, fig. 10. (云南德钦、丽江)

翅展 27mm。头、胸及前翅黑褐色，前翅基线黑色锯齿形，外侧衬灰色，内线黑色，外侧衬灰色，自前缘脉后外弯，环纹大，斜椭圆形，淡褐色，中有褐圈，肾纹大，色似环纹，外线黑色，微锯齿形，外衬灰色，自前缘脉后外弯至 2 脉后垂向翅后缘，内线与外线之间的亚中褶色暗并有黑色纹，外区前缘脉上有一列灰黄斜纹，外线后端外侧至臀角有一灰黄色椭圆形斑，界限不明晰，亚端线灰黄色，锯齿形，有间断，端线由一系列新月形黑点组成，缘毛基部灰黄色；后翅灰褐色，端区色暗，横脉纹黑褐色；腹部灰色，布有黑点。

分布 福建、云南。

宝夜蛾属 *Margelana* Staudinger

Margelana Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 20.

Type-species: *Margelana versicolor* Staudinger.

喙不发达，下唇须向前伸，第三节小，额平滑，复眼大，雄蛾触角双栉形或锯齿形；胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开的毛簇；腹部背面无毛簇；前翅有副室。

宝夜蛾 *Margelana versicolor* Staudinger (图版 XXXII-4)

Margelana versicolor Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 20. (乌兹别克)