

8. 环纹、肾纹间有黑斑 9
 环纹、肾纹间无黑斑 斗斑禾夜蛾 *O. fodinae*
 9. 前翅外线外方色浅 友禾夜蛾 *O. sodalis*
 前翅一色 克禾夜蛾 *O. khasiana*

竹笋禾夜蛾 *Oligia vulgaris* (Butler) (图版XXXI-30)

Polydesma vulgaris Butler, 1886, Trans. ent. Soc. p. 135. (日本)

Oligia vulgaris: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 372. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 261.

Bambusiphila vulgaris: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 746.

翅展 38—43mm。头、胸黄褐色；前翅浅褐色，基部有一大褐斑，亚端区前缘有一漏斗形大褐斑，基线褐色，从褐斑中穿过，内线双线褐色，波浪形，环纹及肾纹黄白色，肾纹外缘白色，中线褐色，粗，锯齿形，后端与外线相接，外线黄白色，锯齿形，齿尖为褐点和白点，肾纹与外线之间有明显褐斑，亚端线黄白色，在 2、5 脉处内凸，在 5 脉处内、外侧均有黑尖纹，端线为一列黑棕色长点，亚端线与端线间的后半带棕色；后翅褐色，基部微黄。

寄主 竹笋。

分布 江苏、浙江、湖北、湖南、福建、江西、云南；日本。

白点禾夜蛾 *Oligia niveiplagoides* Poole (图版XXXI-31)

Oligia niveiplagoides Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. p. 723. (广东连平)

Oligia niveiplaga Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 97, pl. 7, fig. 1.

翅展 43mm。头、胸及前翅暗红褐色，前翅基、内线均双线黑色，大锯齿形，剑纹小，环纹稍斜，黑边，肾纹内缘暗褐色，外缘有小白圆点，后缘有小白点，外线双线黑色，锯齿形，齿尖在各翅膀上为白点，在中褶处稍内凸，5 脉后内弯，外区前缘脉上有一列白点，亚端线浅灰色，两侧暗褐色，常成斑点状，在 7 脉处外凸，中段外弯，翅外缘有一列新月形黑点；后翅黑褐色，缘毛黄白色，中有一暗褐线；腹部灰褐色，背毛簇褐黑色。

分布 湖南、广东。

草禾夜蛾 *Oligia furuncula* (Denis et Schiffermüller) (图版XXXI-32)

Noctua furuncula [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 89. (奥地利)

Phalaena bicoloria Villers, 1789, Linn. ent. 2: 288.

Oligia furuncula: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 393. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 261.