

Pyrrhidivalva sordida: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 780.

翅展 32—40mm。头、胸灰褐杂褐黑色；前翅褐色带灰色，内线、外线间带有红褐色，基线前端及中室处现黑色，内线、中线及外线黑色，波浪形，前者后端内侧一黑斑，环、肾纹同翅色，亚端线浅红褐色，外侧衬黑褐色，端区暗褐色，亚端线前端内侧一黑褐斑；后翅暗褐色有光泽；腹部褐灰色。

分布 黑龙江、内蒙古；日本，朝鲜。

曲线禾夜蛾 *Oligia vulnerata* (Butler) (图版 XXXI-36)

Miana vulnerata Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 84. (日本东京)

Oligia vulnerata: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 388. —Chen, 1982, Icon, Het. Sin. 3: 261.

Oligonyx vulnerata: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 779.

翅展 20—28mm。头、胸暗褐杂灰色；前翅褐杂灰色，基线仅前端可见黑色，内线、中线及外线黑色，前者后端外侧一黑点，中线模糊，外区亚中褶杂少许血红色，亚端线灰白色，中段外弯，前段内侧一黑褐纹；后翅褐色，基部稍白；腹部褐色杂灰色。雄蛾抱器瓣窄长，抱钩紧贴瓣腹缘 (图 495)。




图 495 曲线禾夜蛾 *Oligia vulnerata* (Butler) ♂ 外生殖器

分布 黑龙江、河北、湖北、江西；日本。

友禾夜蛾 *Oligia sodalis* Draudt (图版 XXXI-37)

Oligia sodalis Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 100, pl. 7, fig. 5. (衡山)

Oligia sodalis: Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.983.

翅展 26mm。头部与胸部灰色杂褐色；前翅灰白色带褐色，基线双线黑色，自前缘脉至亚中褶，内线双线黑色，内一线弱，波曲外斜，环纹大，斜圆形，灰白色，有不完整的黑边，肾纹长，色似环纹，环纹与肾纹之间带有黑色，外线双线黑色，外一线弱，自前缘脉后外斜至 6 脉折向内斜，1 脉后稍外斜，内线与外线间的亚中褶带黑色，亚端线隐约可见，较平稳外弯，翅外缘有一列黑点；后翅浅褐色，端区色较暗，隐约可见微黑的横脉纹及外线；腹部灰褐色。

分布 湖南、福建。

斗斑禾夜蛾 *Oligia fodinae* (Oberthür) (图版 XXXI-38)

Miana fodinae Oberthür, 1880, Et. ent. 5: 73, pl. 3, fig. 12. (Askold)

Chytonix fodinae: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 612.

Oligia fodinae: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 743.

翅展 22mm。头、胸褐色杂灰色；前翅褐灰色，部分带赤褐色，后缘区色较灰，基线黑褐色，内线、外线均双线黑色，后者间断，在翅脉上为点状，环纹及肾纹灰色，前者斜椭圆形，后者中凹，中线仅前段现一黑纹，亚中褶中段带有黑色，1 脉前一浓黑纵条，亚端线不明显，灰白色，各翅脉端为一白点；后翅褐灰色；腹部灰色杂褐色。

分布 黑龙江、江西；日本，俄罗斯。

克禾夜蛾 *Oligia khasiana* (Hampson) (图版 XXXI-39)

Bryophila khasiana Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 299. (印度)

Oligia chasiana Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 373.

Oligia khasiana: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Soc. 40: 99.

翅展 28mm。头、胸黄白杂褐黑色；前翅黄白色，部分带褐色，各横线黑色，内线内方一黑褐宽带，剑纹暗褐色，环纹大，黄白色斜圆形，中线后半不显，亚中褶在内线、中线间一黑条，外线双线锯齿形，亚端线不显，亚端区有模糊暗褐斑，端区中褶处有模糊黑褐斑；后翅黄白，端区带褐色；腹部黄白带褐色。

分布 陕西、江苏、浙江、云南；不丹，印度。

维夜蛾属 *Chalconyx* Sugi

Chalconyx Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 780.

Type-species: *Gerbatha ypsilon* Butler.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，前缘饰毛，第三节短，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，头、胸主要被鳞片，前、后胸有散开形毛簇，腹部