

Type-species: *Lycimna polymesata* Walker.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，第三节短小，触角线形；胸部被平滑鳞片；前翅顶角尖突，外缘中部外突成一齿，有一副室；后翅中室短，臀角稍后突，后缘端部较平。

### 立夜蛾 *Lycimna polymesata* Walker (图版 LXII-4)

*Lycimna polymesata* Walker, 1860, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 20: 215. (Silhet)

*Lycimna polymesata*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 550, fig. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 370. ——Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p. 548.

翅展 43 mm。头部橘黄色，有黑细点，下唇须上缘带有砖红色；胸部背面橘黄色，散布黑色细点，下胸浅黄色，足褐灰色，前足与中足胫节外侧带有红褐色，颈板端部暗褐色；前翅橘黄色带红色，并杂有黑灰色，基线黑色波曲，自前缘脉至 1 脉，内线双线黑色，波浪形，在亚中褶处强外凸，环纹不清晰，内侧有一黑色斜点，中线黑色，较粗，自前缘脉外斜至 4 脉强折角直线内斜，肾纹隐约可见二黑点，外线双线黑色，波浪形，自前缘脉外斜至 9 脉，外弯至 3 脉，其后为一小白斑，后接一波浪形橘黄色纹至后缘，3 脉后内侧衬黑色，亚端线黑色，波浪形，自前缘脉外斜至 5 脉，折角内斜并呈锯齿形，后端达臀角，一黑线自亚端线前端内斜至外线，翅外缘及缘毛端部各有一列黑点，顶角稍外突，翅外缘中部外突；后翅橘黄色，前缘区淡黄色，中线粗，黑色，自前缘区后内斜至翅后缘，近呈直线，中室端部有隐约的淡黄色点，外线黑色，锯齿形，齿尖为黑点，中线与外线之间带有灰色，亚端线黑色，锯齿形，近翅外缘有一列黑点，缘毛深棕色；腹部褐灰色带红色，基节背面大部橘黄色。

分布 江西、海南；印度，缅甸，孟加拉国。

## 瞳夜蛾属 *Ommatophora* Guenée

*Ommatophora* Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 3: 190.

Type-species: *Phalaena luminosa* Cramer.

喙发达，下唇须向上伸，第二节紧贴前额，达头顶，第三节细长，触角线形，足胫节饰毛，前胫饰密毛，后足跗节上缘饰毛；前翅顶角约呈直角形；后翅中室短。

### 瞳夜蛾 *Ommatophora luminosa* (Cramer) (图版 LXII-3)

*Phalaena Noctua luminosa* Cramer, 1780, Uitl. Kappell. 3: 147, pl. 274, fig. D. index p. 175. (爪哇)

*Ommatophora luminosa*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 552. ——Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 34. ——Barlow, 1982, Moths SE Asia p.103. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin.

3: 370.

翅展 55 mm。头部暗褐色，下唇须第一节外侧有一黑斑，第三节细长；颈板暗褐色，基部两侧各有一黑斑；胸部背面暗褐色；前翅褐色，基半部及前缘区有紫色光泽，基线黑色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，内线黑色，波浪形外弯，1脉后较强外凸，环纹不显，肾纹新月形，粉红色，边缘黑色及白色，其外方有一黑斑，中有绿影，一黑线自翅前缘中部外弯，环绕肾纹外的黑斑达肾纹后端，合成一近眼形斑，外线黑色，自前缘脉外斜，在中褶处折角内斜，在3脉处内伸至肾纹后再折向后行，在亚中褶处成一外突齿，其后波曲，外线外侧衬粉红色，外区亦带淡褐红色，亚端线粉红色，在前缘脉后稍外弯，9脉后近呈直线内斜，前、后端近细锯齿形，端线双线黑色，波浪形；后翅暗褐色，外半带有褐红色，中线黑色，较粗，自前缘外斜至中褶折向内斜，外线黑色，细锯齿形外弯，至1脉后外斜，亚端线双线黑色，微锯齿形，内一线粗，端线双线黑色，锯齿形；腹部暗褐色。

成虫吸食柑橘果汁。

**分布** 广东、海南；印度，印度尼西亚。

## 枝夜蛾属 *Ramadasa* Moore

*Ramadasa* Moore, 1877, Proc. zool. Soc. Lond. p. 603.

Type-species: *Chasmina pavo* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，约达头顶，第三节短小，触角线形；胸部被鳞，无毛簇；前翅前缘拱曲，雄蛾前翅3、4、5脉基部弯曲，有一副室，中室与亚中褶稍隆起，翅外缘后半内斜。

### 枝夜蛾 *Ramadasa pavo* (Walker) (图版 LXII-5)

*Chasmina pavo* Walker, 1856, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 9: 147. (斯里兰卡)

*Ramadasa pavo*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 45. ——Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 34. ——Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 103, pl. 34, fig. 2. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 323.

翅展 36—47 mm。头部银灰色杂灰色，额上部有一黑条一黄条，两触角间有一黑条，触角基节上缘黑色，下缘黄色，复眼后方褐黄色杂黑色，下唇须黄色，基部与端部上缘黑色；胸部银灰色杂灰色，颈板基部黑色，下胸橙黄色，足黄色，前足腿节上缘黑色，各足胫节与跗节有黑斑，中、后足胫距有黑斑，前足胫节外侧有二黑斜条，中、后足胫节外侧有二黑斑；前翅淡红棕色，中线内方密布蓝灰色与黑色细点，此区前缘脉黄色，有5个黑点，中线黑色，微曲外斜，肾纹为一窄长黑色弧形条，内侧衬紫蓝色，外