

Phornacissa Walker, 1862, Trans. ent. Soc. Lond. 1: 311.

Metahadena Morrison, 1875, Proc. Acad. nat. Sci, Philad, 17: 431.

Copihadena Morrison, 1875, Canad, ent. 7: 91.

喙发达, 下唇须斜向上伸, 第二节前缘有长毛, 第三节向前伸, 额平滑, 复眼圆大, 雄蛾触角线形, 有纤毛; 头部及胸部主要是鳞片, 前、后胸有散开的毛簇, 前足胫节短, 内缘端部有弯爪, 外缘或有一细爪; 腹部基部有粗毛, 无毛簇; 前翅有副室。

种 检 索 表

后翅端带明显 准爪冬夜蛾 *Oncocnemis exacta*
后翅端带模糊 野爪冬夜蛾 *O. campicola*

野爪冬夜蛾 *Oncocnemis campicola* Lederer (图版 XXIV-7)

Oncocnemis campicola Lederer, 1853, Verh. zool.-bot. Ver. Wien. 3: 369, pl. 3, fig. 5. (西伯利亚)

Oncocnemis campicola: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 159. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 724. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 313.

翅展 32mm。头、胸黑褐色; 前翅蓝灰色, 中区暗褐色, 基线、外线均双线暗褐色, 内线黑褐色, 剑纹小, 环纹、肾纹褐色围以蓝白环, 中线黑色模糊, 亚端线蓝白色锯齿形, 内侧一列黑齿纹; 后翅白色, 翅脉及端区褐色; 腹部灰褐色, 基部灰白。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆、河北、甘肃、山东、福建; 蒙古, 俄罗斯。

准爪冬夜蛾 *Oncocnemis exacta* Christoph (图版 XXIV-8)

Oncocnemis exacta Christoph. 1887, Mem. Lepid. 3: 72, pl. 4, fig. 1. (土库曼)

Oncocnemis exacta: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 154. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 120. —Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. Worle 3 Suppl. p.133. —Boursin, 1934, Rev. Fr. ent. 1:60. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3:313.

翅展 28mm。头部与胸部灰褐色, 布有黑褐细点, 足跗节外侧黑色, 各节间有白斑; 前翅灰褐色, 外线至亚端线间暗褐色, 基线黑色, 自前缘脉至亚中褶, 内线黑色, 波浪形外斜, 剑纹只现少许黑点, 环纹小, 长圆形, 灰白色, 中央褐色, 肾纹白色, 中央褐色, 有黑边, 中线模糊, 暗褐色, 外线细, 黑色, 外侧明显衬白色, 内侧仅前端及后半白色, 自前缘脉外弯, 4脉后波浪形内斜, 亚端线隐约可见褐灰色, 锯齿形, 在7脉处成外凸齿, 3脉后内弯, 端线由一列黑点组成, 缘毛黄白色, 中有一褐线; 后翅白色, 翅脉褐色, 端区较宽黑褐色, 缘毛白色, 基部微黄, 中有一褐线; 腹部褐灰色, 布有褐色细点, 臀毛簇黄褐色。

分布 新疆; 蒙古, 中亚地区。