

喙发达，下唇须向上伸，第二节到达头顶，第三节相当长，额平滑，上方有椎形毛簇；雄蛾触角具纤毛，胸部仅具毛，无毛簇；前足基节、腿节、胫节都具长毛，中足及后足的胫节微具缘毛，前足胫节无刺，中足及后足胫节有刺；腹部仅基部几节有毛簇；前翅很狭长，翅端圆形，外缘弯曲；后翅中室约为翅长的1/3。

种 检 索 表

1. 雄蛾后翅反面在1脉处饰毛 枯安钮夜蛾 *Ophiusa coronata*
- 雄蛾后翅反面在1脉处无毛 2
2. 腹部黄色 3
- 腹部非黄色 4
3. 前翅浅黄绿色 安钮夜蛾 *O. tirhaca*
- 前翅紫灰色 同安钮夜蛾 *O. disjungena*
4. 前翅亚端线在7脉处强外弯 橘安钮夜蛾 *O. triphaenoides*
- 前翅亚端线近呈直线 直安钮夜蛾 *O. trapezium*

枯安钮夜蛾 *Ophiusa coronata* (Fabricius) (图版LIII-4)

Noctua coronata Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 596. (中国)

Noctua ancilla Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 17.

Ophiusa coronata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 502. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 101.

Anua coronata: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 473. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 29. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 353.

翅展76—80 mm。头、胸褐色；前翅赭褐色，基线，内线及外线暗褐色，内线直线外斜，环纹为一褐环，肾纹大，灰褐或黑棕色，或仅现隐约的轮廓，亚端线浅褐色内斜，翅外缘一列黑点；后翅黄色，内区及亚端区各一黑褐宽带；腹部黄色，有黑横纹。

寄主 使君子。成虫吸食柑桔等果汁。

分布 福建、广东、海南、广西、云南；锡金，印度，斯里兰卡，马来西亚，菲律宾，新加坡，印度尼西亚，大洋洲，非洲东部。

安钮夜蛾 *Ophiusa tirhaca* (Cramer) (图版LIII-5)

Phalaena Noctua tirhaca Cramer, 1777, Utl. Kapell. 2: 116, pl. 172, fig. E. (好望角)

Ophiusa separans Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1357.

Anua tirhaca: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 431. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 473. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 353.

Ophiusa tirhaca: Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 469.