



图 667 嘴壶夜蛾 *Oraesia emarginata*

(Fabricius) ♂ 外生殖器

分布 山东、江苏、浙江、台湾、福建、广东、海南、广西、云南；日本，朝鲜，印度。

*Oraesia emarginata*: Warren, 1913, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 383. —Chen, 1983, *Icon. Het. Sin.* 3: 371. —Banziger, 1983, *Ent. Scand.* 14: 490.

翅展 34—40 mm。头、胸褐杂黄色；前翅棕褐色，基线、内线及中线黑棕色，基线、内线波浪形，肾纹不明显，外线暗褐色，在 6 脉折角，亚端线暗褐色锯齿形内斜，二黑褐线自顶角内斜，内一线后部不显；后翅褐灰色，端区与翅脉暗褐色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣稍窄长，无附件（图 667）。

分布 山东、江苏、浙江、台湾、福建、广东、海南、广西、云南；日本，朝鲜，印度。

### 鸟嘴壶夜蛾 *Oraesia excavata* (Butler) (图版 LXIII-2)

*Calpe excavata* Butler, 1878, *Ann. Mag. nat. Hist.* 5, 1: 202. (日本横滨)

*Calpe excavata*: Leech, 1889, *Trans. ent. Soc.* p. 136.

*Oraesia excavata*: Warren, 1913, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 384. —Chen, 1982, *Icon. Het. Sin.* 3: 371. —Sugi, 1982, in Inoue, *Moths Jap.* 1: 862. —Banziger, 1983, *Ent. Scand.* 14: 485.

翅展 49 mm。头部赤橙色，雄蛾触角单栉形，栉齿长，基节有一白斑，额杂有白色，中部有一黑褐色竖纹，下唇须第二节向端部渐宽，上缘有黑斑，第一、二节中部有一黑色纵线，第二节中部有一黑色斜纹；胸部背面赭褐色，颈板赤橙色，下胸布有黑点，足胫节外侧有黑点及黑色斜纹；前翅褐色带有紫色，基线黑棕色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，内线黑棕色双线，波浪形内斜，中线较粗，黑色，自前缘脉双曲形外斜至中室下角，折角内斜，中室后缘黑棕色，外线细弱双线，黑棕色，锯齿形，自前缘脉外斜至 9 脉折向内斜，亚端线黑棕色，不规则波曲，自顶角至亚中褶，后半内侧另有一黑棕色波曲线，一黑棕色线自顶角直线内斜至 3 脉近基部，顶角外突成锐齿，翅外缘后半斜削，翅后缘内中部后突成一巨齿，其外方的翅后缘内凹呈弧形，臀角后突成一齿；后翅黄色，端区微带褐色；腹部灰黄色，背面带有褐色。

寄主 成虫吸食柑橘、苹果、梨、葡萄、无花果、桃、芒果、黄皮等果汁。

分布 山东、江苏、浙江、湖南、台湾、福建、广东、广西、云南；朝鲜，日本。

### 金鳞夜蛾属 *Sarobides* Hampson

*Sarobides* Hampson, 1926, *Descr. new Gen. & Spec. Noct. Br. Mus.* p. 410.