

端区灰色，中室下角至外线黄白色，翅后缘一黄白纵纹，基线双线黄褐杂白色，内线双线黑色，线间黄白色，剑纹大，前缘达中脉，环纹有白环，肾纹灰白色，外线双线黑褐色，线间灰白色，亚端线白色间断为细纹，内侧有黑齿纹，前端内侧有黑斑；后翅褐黄色；腹部灰褐色。

分布 西藏；印度，克什米尔地区。

折线激夜蛾 *Oroplexia retrahens* (Walker) (图版 XXXII-28)

Hadena retrahens Walker, 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 11: 757. (斯里兰卡)

Oroplexia retrahens: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 512. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 265.

翅展 32mm。头、胸、腹褐灰色；前翅灰褐带紫色，中区、端区带黑色，翅脉微白，基线、内线均双线黑色，后者双线间灰白色，后端内侧一黑纹，环纹灰色，剑纹黑褐色，肾纹大部黑褐，中央灰色，外线双线白色，线间及内侧黑色，亚端线白色，在 3、4、7 脉外突成齿，端线为一列黑点；后翅褐色，外线微白。

分布 云南、西藏；锡金，印度，斯里兰卡，克什米尔地区。

达沓夜蛾属 *Data* Walker

Data Walker, 1862, J. Linn. Soc., zool. 6: 191.

Type-species: *Data thalpoiloides* Walker.

Lasioceles Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 204.

喙发达，下唇须第二节约达头顶，第三节长，额圆形，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部主要是鳞片，前、后胸有散开的毛簇，下胸有长毛，雄蛾后足腿节及胫节有大毛簇，后足第一跗节有毛；腹部有一列毛簇；前翅顶角较尖较拱，外缘锯齿形，臀角处微有鳞齿，有副室。

种 检 索 表

1. 后翅黄色 2
后翅暗褐色 齿达沓夜蛾 *Data clavis*
2. 前翅亚端区色浅 白质达沓夜蛾 *D. obliterated*
前翅一色 3
3. 前翅翅脉微白 美达沓夜蛾 *D. callopioides*
前翅翅脉不白 达沓夜蛾 *D. thalpoiloides*

美达沓夜蛾 *Data callopioides* (Moore) (图版 XXXII-29)

Thalpoila callopioides Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 344. (印度)