

翅展 56—68mm。头、胸、腹及前翅棕褐色，前翅基线由三个黑斑组成，其余各横线黑色，剑纹只现一黑点，亚端线在 4—6 脉间有一黑纹，内侧二黑点，内线、外线间为黑褐色区；后翅褐色。雄蛾左右抱器瓣异形，抱钩强弯（图 451）。

分布 浙江、江西、四川、云南；日本。

### 天目胖夜蛾 *Orthogonia basimacula* (Draudt) (图版 XXVIII-8)

*Orthogonia basimacula* Draudt, 1939, Ent. Rdsch. 56: 146, pl. 2, fig. 4. (西天目山)

翅展 47—55mm。头、胸及前翅灰褐色，后者杂有细黑点，翅脉浅灰色，基线不显，内线灰色，外侧衬黑色，1 脉后有一黑斑，剑纹外端可见，环纹、肾纹灰黄色，后者似足掌形，外线灰黄色波浪形，前端内侧一黑纹；后翅与腹部暗棕色。雄蛾抱器瓣向端渐尖（图 452）。




图 452 天目胖夜蛾 *Orthogonia basimacula* (Draudt) ♂ 外生殖器

分布 浙江。

### 白斑胖夜蛾 *Orthogonia canimacula* Warren (图版 XXVIII-9)

*Orthogonia canimacula* Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 161, pl. 39a. (中国: Chetou)

*Orthogonia canimacula*: Draudt, 1939, Ent. Rdsch. 56: 148.

*Orthogonia canimacula*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 252.

翅展 61mm。头部黄褐色；胸部褐黑色；前翅黑棕色，基线、内线均双线黑色，剑纹为一黑点，环纹、肾纹褐灰色，中室后缘外半白色，外线外侧一系列黑点及暗褐纹，亚端线外方另一黑线，外线与亚端线间浅褐灰色，亚端区 3、4 脉处有暗灰色肾形大斑，近顶角有三角形黑斑；后翅及腹部黑棕色。雄蛾抱器瓣端缘稍凹（图 453）。