

图 456 太白胖夜蛾 *Orthogonia tapaishana* (Draudt) ♂ 外生殖器

分布 陕西。

华胖夜蛾 *Orthogonia plumbinotata* (Hampson) (图版 XXVIII-16)

Orthogonia plumbinotata Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 46, pl. 108, fig. 17.
(湖北长阳)

Orthogonia plumbinotata: Draudt, 1939, Ent. Rdsch. 56: 148.




图 457 华胖夜蛾 *Orthogonia plumbinotata* (Hampson) ♂ 外生殖器

翅展 55mm。头部黄褐色；胸部暗红褐色；前翅浅红褐色，中段大部带深棕色，中脉及外线外方的翅脉灰或灰白色，后缘区色浅，亚端线红褐色，其余各横线黑色，基

线、内线及外线均双线，内线后端外侧一黑斑，中线、外线后半锯齿形，剑纹为一黑点，环纹浅赭黄色，肾纹大，前端斜外伸，约呈舌形，两纹间有一黑斑；后翅与腹部暗褐色。雄蛾抱器瓣向端渐窄，背缘波曲（图 457）。

分布 湖北、浙江。

幻夜蛾属 *Sasunaga* Moore

Sasunaga Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 342.

Type-species: *Hadena tenebrosa* Moore.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达额中部，第三节短，平伸，额无突起，有毛簇，眼大，雄蛾触角线形；胸部背面有双脊形毛簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅窄长，外缘斜，有副室。

种 检 索 表

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. 前翅中褶外半有暗纵条 | 长斑幻夜蛾 <i>Sasunaga longipennis</i> |
| 前翅中褶外半无暗纵条 | 2 |
| 2. 前翅内半部前缘区色暗 | 3 |
| 前翅内半部前缘区不明显色暗 | 4 |
| 3. 前翅暗色区后衬白色 | 霉幻夜蛾 <i>S. leucorina</i> |
| 前翅暗色区无后衬白色 | 尖纹幻夜蛾 <i>S. apiciplaga</i> |
| 4. 前翅亚中褶外半白色 | 幻夜蛾 <i>S. tenebrosa</i> |
| 前翅亚中褶外半非白色 | 5 |
| 5. 前翅浅赭黄色 | 间纹幻夜蛾 <i>S. interrupta</i> |
| 前翅非浅赭黄色 | 6 |
| 6. 肾纹外缘中部外突成一齿 | 酒色幻夜蛾 <i>S. oenistis</i> |
| 肾纹不清晰 | 纹幻夜蛾 <i>basiplaga</i> |

幻夜蛾 *Sasunaga tenebrosa* (Moore) (图版 XXVIII-3)

Hadena tenebrosa Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 59. (Bengal)

Sasunaga tenebrosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 128. —Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 144.

Magusa tenebrosa: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 58. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 252.

翅展 40mm。头、胸棕色；前翅褐色微带霉绿色，前翅基线、内线及外线均双线黑色，内线波浪形，外线锯齿形，基线后半似帚形纹，剑纹基部黑色，紧接一白纹，端部