

**直带夜蛾 *Orthozona quadrilineata* (Moore) (图版 LXII-13)**

*Madopa quadrilineata* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 193. (大吉岭)

*Orthozona quadrilineata*: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 94. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 386. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 155.

翅展 37 mm。头部黄褐色，触角基节有一白斑，下唇须第二节上缘饰毛，第三节短，端部尖而白；胸部背面黄褐色，足外侧黑褐色，跗节有褐白色斑位于各节间；前翅淡黄褐色或灰色带红褐色，前缘区内半色较暗，内线细弱，褐色，自前缘脉微外斜至中室其后内弯，1脉后外凸，环纹只现一褐色点，中线明显，较粗，棕色，直线内斜，肾纹隐约可见褐色边缘，细窄，外侧中凹，外线褐色，极细弱，不规则波浪形内斜，在中褶与亚中褶处稍内凹，亚端线粗，棕色，自顶角较直内斜，外侧另有一棕色波浪形细线，端区色较暗；后翅淡赭黄色，内线较粗，棕色，自中室后缘内斜至1脉，亚端线粗，棕色，自前缘后外斜，至7脉折向内斜，在亚中褶后稍外斜，端线由一系列黑点组成；腹部暗褐色。

**分布** 湖南、云南；锡金，印度。

**锉夜蛾属 *Blasticorhinus* Butler**

*Blasticorhinus* Butler, 1893, Ann. Mag. nat. Hist. 6, 12: 46.

Type-species: *Thermesia rivulosa* Walker.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节达头顶，复眼圆大；胸部及腹部具鳞片，胫节无刺；前翅前缘拱曲，雄蛾后翅后缘基部有一大泡形褶，其上有长毛。

**种 检 索 表**

体大，翅展 36—43 mm，肾纹后有白点 ..... 寒锉夜蛾 *Blasticorhinus ussuriensis*  
体小，翅展 30 mm，肾纹后无白点 ..... 锉夜蛾 *B. rivularis*

**寒锉夜蛾 *Blasticorhinus ussuriensis* (Bremer) (图版 LXII-14)**

*Remigia ussuriensis* Bremer, 1861, Bull. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. 3: 495. (Ussuri; Emma)

*Azazia unduligera* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 1: 293.

*Blasticorhinus ussuriensis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 167. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 870. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 370.

翅展 36—43 mm。头部浅褐色，头顶及下唇须棕色，触角背缘有一列黑点；胸部