

色，波曲形，外线黄色，前端曲，其后直线内斜，内侧另有一褐色细线，亚端线黄色，前半弧形内弯，至5脉后呈锯齿形，缘毛基部有一黄白线；腹部背面黑棕色，各节间有黄色横线，腹面黄白色。

**分布** 黑龙江、安徽、湖北；日本，朝鲜，非洲。

### 紫褐巧夜蛾 *Oruza obliquaria* Marumo (图版XL-39)

*Oruza obliquaria* Marumo, 1936, Kontyu, 6: 12, fig. 2. (日本)

*Oruza ryukyuensis* Tanaka, 1980, Tinea 11: 45.

*Oruza obliquaria*: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 147, pl. 104, fig. 2266. — Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 811, pl. 196, figs. 58—59; pl. 372, fig. 13 male genitalia.

翅展 21 mm。头部与胸部褐色微带紫色，下唇须色较暗；前翅褐色微带紫色，前缘区褐黄，成一纵条，向顶角渐窄，内线褐黄色，较直，微外斜，环纹不显，肾纹褐黄色，极窄，稍弯曲，外线褐黄色，直线内斜，亚端线褐黄色，自前缘脉微曲外斜，至4脉成一外突齿，其后锯齿形内斜；后翅褐色，横脉纹极细窄，褐黄色，外线褐黄色，近呈直线内斜，亚端线褐黄色，锯齿形，自前缘外斜，在4脉折角内斜；腹部暗褐色。

**分布** 四川；日本。

## 博夜蛾属 *Bostrodes* Hampson

*Bostrodes* Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 280.

Type-species: *Bostrodes proleuca* Hampson.

喙不发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，第三节短，额平滑无突起，复眼大而圆，雄蛾触角线形，基部有较密的鳞；胸部主要被鳞，无毛簇；腹部背面无毛簇；前翅有副室。

### 点肾博夜蛾 *Bostrodes tenuilinea* Warren (图版XL-40)

*Bostrodes tenuilinea* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 254, pl. 24k. (印度)

*Bostrodes tenuilina*: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 120.

翅展 22 mm。头部与胸部红褐色，颈板端部赭黄色，前翅红褐色，前缘区淡赭黄色，内线黄色，微曲内斜，肾纹只现一黄白点，外线浅赭黄色，微曲内斜，亚端线浅赭色，在3、4脉处呈大锯齿形外突，亚端区前缘脉上有黑点；后翅褐色，外线色泽与曲度均似前翅，亚端线浅赭色，中段外突较显，其后波曲。

**分布** 四川；印度。