

色，前缘区除顶角外白色带赤褐色，其基部延伸至翅后缘，前缘脉基部稍黑，内线不显，仅在前缘脉现一黑点，外线细弱，黑色，外侧衬白色，自前缘脉强外斜，在6脉折角内斜并呈波浪形，亚端线暗褐色，不清晰，外侧衬灰白色，中段外弯，近翅外缘有一列黑点，内侧在中褶处杂黄色，外侧有一列白色细纹，端线黑色，波浪形，缘毛基部有一黄白线；后翅黑褐色，基部白色，横脉纹小，黑色，外线细弱，黑色，自前缘脉外斜，4脉后呈波浪形，外侧有暗褐纹，近翅外缘有一列黑点，端线黑色，波浪形；腹部黑褐色，基部背面白色。

分布 海南；斯里兰卡。

宽缘巧夜蛾 *Oruza rectangulata* Warren (图版 XL-34)

Oruza rectangulata Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 243, pl. 24g. (巴布亚新几内亚)

翅展 22 mm。头部与颈板红棕色；胸部背面白色，翅基片中部有微褐纹，下胸与足浅褐色；前翅红棕色，前缘区白色，成一宽纵带，其基部后缘达翅后缘基区，白纵带中带有黑褐色，尤其基部前缘明显，内半后部及外半带有红褐色，肾纹仅在中室下角现一黑褐点，内线仅在中室前现一内斜黑褐纹，外线白色，微波曲，向后渐细，亚端线隐约可见，白色，间断，在6脉前有一红棕小斑，近翅外缘有一列黑点，5脉前的点较大，外侧衬白色；后翅红棕色，基部白色，外线白色，大波曲，近翅外缘有一列黑点；腹部暗红棕色，基部背面白色。

分布 海南；巴布亚新几内亚。

白缘巧夜蛾 *Oruza glaucotorna* Hampson (图版 XL-35)

Oruza glaucotorna Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 249, pl. 156, fig. 6. (日本)

Oruza glaucotorna: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 272, pl. 51k. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 131. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 146. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 810. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 119.

翅展 21 mm。头部暗褐杂少许灰色；胸部黄白色，翅基半后半红棕色；前翅暗红棕色，前缘区白色，中室下角一白点，外线白色，折角于7脉，外区前缘有二黑褐色，4脉后的外区大部白色，亚端线白色，4脉后锯齿形，线外方在4脉后白色，翅外缘一列黑点；后翅暗红棕色，外线及亚端线白色，臀角区一大白斑，翅外缘一列黑点；腹部红棕色，端部黄白色。

分布 江西；日本。