

分色弱夜蛾 *Ozarba bipars* Hampson (图版 XLI-12)

Ozarba bipars Hampson, 1891, Ill. Het. Br. Mus. 8: 13, 75, pl. 145, fig. 2. (印度)

Metachrostis bipars: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 329.

Eustrotia bipars: Hampson, 1910, cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 600.

Ozarba bipars: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 268, pl. 25b. —Berio, 1950, Ann. Mus. Civ. Storia nat. Giac. Doria 64: 148, fig. 50 male genitalia. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 121.

翅展 20 mm。头、胸及腹部黑褐杂灰色；前翅紫褐色，内线内方灰色带紫褐色，前缘区有桃红点，基线灰白色，内线与亚端线黄白色，外线黑褐色，内侧亚中褶处一黑斑，外侧在 6 脉前后各一黑纹，肾纹窄曲，灰色有白环及黑点组成的边缘，内、外缘稍凹，亚端线锯齿形，翅外缘一列黑点；后翅褐色，端区微黑。

分布 广东、海南；印度。

红褐弱夜蛾 *Ozarba brunnea* (Leech) (图版 XLI-13)

Metachrostis brunnea Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 157. (湖北宜昌、长阳)

Ozarba brunnea: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 447, pl. 162, fig. 22. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 375, pl. 51n. —Berio, 1950, Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Giac. Doria 64: 154, fig. 73 male genitalia. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 823.

翅展 16—20 mm。头部与胸部浅红褐色，下胸与足白色带褐色，前足胫节与跗节黑色，有白环纹；前翅浅红褐色，布有褐色细点，内线双线，细波浪形内斜，在中室后外弯，线前端内侧有一近三角形暗褐斑，翅中区外半带有红褐色，中线黑褐色，粗而模糊，微波浪形，自前缘脉外斜至中室下角折向内斜，肾纹浅褐色，内侧有一黑曲纹，中央浅褐色，外线双线褐色，线间白色，自前缘脉外弯至 4 脉后内斜至亚中褶折向后垂，线外侧的 6、5、4 脉上各有一黑纹，亚端线褐色，在 7 脉处外凸，中段外弯，线内侧有一列黑褐斑纹，前段内侧有一黑褐斜纹，外侧部分衬白色，翅外缘有一列半圆形黑点；后翅灰褐色，缘毛微白；腹部褐灰色。

寄主 杂草。

分布 浙江、湖北、湖南、江西；日本，印度。

迷弱夜蛾 *Ozarba incondita* Butler (图版 XLI-14)

Ozarba incondita Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 69, pl. 130, fig. 13. (印度)

Metachrostis incondita: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 328. —Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 448. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 271. —