

### 分色弱夜蛾 *Ozarba bipars* Hampson (图版XLI-12)

*Ozarba bipars* Hampson, 1891, Ill. Het. Br. Mus. 8: 13, 75, pl. 145, fig. 2. (印度)

*Metachrostis bipars*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 329.

*Eustrotia bipars*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 600.

*Ozarba bipars*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 268, pl. 25b. ——Berio, 1950, Ann. Mus. Civ. Storia nat. Giac. Doria 64: 148, fig. 50 male genitalia. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 121.

翅展 20 mm。头、胸及腹部黑褐杂灰色；前翅紫褐色，内线内方灰色带紫褐色，前缘区有桃红点，基线灰白色，内线与亚端线黄白色，外线黑褐色，内侧亚中褶处一黑斑，外侧在 6 脉前后各一黑纹，肾纹窄曲，灰色有白环及黑点组成的边缘，内、外缘稍凹，亚端线锯齿形，翅外缘一列黑点；后翅褐色，端区微黑。

**分布** 广东、海南；印度。

### 红褐弱夜蛾 *Ozarba brunnea* (Leech) (图版XLI-13)

*Metachrostis brunnea* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 157. (湖北宜昌、长阳)

*Ozarba brunnea*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 447, pl. 162, fig. 22. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 375, pl. 51n. ——Berio, 1950, Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Giac. Doria 64: 154, fig. 73 male genitalia. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 823.

翅展 16—20 mm。头部与胸部浅红褐色，下胸与足白色带褐色，前足胫节与跗节黑色，有白环纹；前翅浅红褐色，布有褐色细点，内线双线，细波浪形内斜，在中室后外弯，线前端内侧有一近三角形暗褐斑，翅中区外半带有红褐色，中线黑褐色，粗而模糊，微波浪形，自前缘脉外斜至中室下角折向内斜，肾纹浅褐色，内侧有一黑曲纹，中央浅褐色，外线双线褐色，线间白色，自前缘脉外弯至 4 脉后内斜至亚中褶折向后垂，线外侧的 6、5、4 脉上各有一黑纹，亚端线褐色，在 7 脉处外凸，中段外弯，线内侧有一列黑褐斑纹，前段内侧有一黑褐斜纹，外侧部分衬白色，翅外缘有一列半圆形黑点；后翅灰褐色，缘毛微白；腹部褐灰色。

**寄主** 杂草。

**分布** 浙江、湖北、湖南、江西；日本，印度。

### 迷弱夜蛾 *Ozarba incondita* Butler (图版XLI-14)

*Ozarba incondita* Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 69, pl. 130, fig. 13. (印度)

*Metachrostis incondita*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 328. ——Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 448. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 271. ——

Berio, 1950, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 64: 154, fig. 72 male genitalia. —  
Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 329.

翅展 19 mm。头、胸暗棕色，前胸有一黑褐纹；前翅棕褐色，基线仅前端现一暗褐纹，内线双线棕色，微曲内斜，中线粗，前端与外线相遇，肾纹灰棕色，内缘一白纹，外线双线棕色，线间白色，在 4、6 脉处成外突齿，亚端线棕色波浪形，外侧衬灰色，外线与亚端线间的前半棕色，端线黑色，亚中褶处一黑点；后翅暗棕色；腹部棕褐色。

**分布** 湖北、江西、四川；不丹，缅甸，斯里兰卡，新加坡。

### 微夜蛾属 *Lophomilia* Warren

*Lophomilia* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411.

Type-species: *Egnasia polybapta* Butler.

本属与 *Pangrapta* 较近似，但腹部前三节上有毛簇；前翅狭长，外缘平整，在 4 脉处不凸出；本属与 *Lophograpta* 也近似，但后翅 3、4 脉不合成一柄；前翅前缘无灰色斑。

### 种 检 索 表

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. 前翅中区后半黄色 .....    | 2                                 |
| 前翅中区后半无明显黄色 .....    | 小冠微夜蛾 <i>Lophomilia polybapta</i> |
| 2. 前翅内、外线后半近平行 ..... | 日微夜蛾 <i>L. takao</i>              |
| 前翅内线不明显 .....        | 座黄微夜蛾 <i>L. flaviplaga</i>        |

### 小冠微夜蛾 *Lophomilia polybapta* (Butler) (图版 XLI-15)

*Egnasia polybapta* Butler, 1879, Het. Colln Br. Mus. 3: 66, pl. 57, fig. 7. (日本横滨)

*Lophomilia polybapta*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411, pl. 71i. — Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 183. — Chu et al., 1963, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 1: 142. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 379. — Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 879. — Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1033.

翅展 25 mm。头部与胸部褐色；前翅红赭色，内半部微黄，内线棕色，自前缘脉外斜至中室折角内斜，后半内侧衬黑色，环纹只现一白点，肾纹只现一黑点，外线白色，内侧衬黑色，外侧衬褐色，自前缘脉后二曲形外弯，至 3 脉后内斜，自 2 脉基部波曲向后，亚端线灰白色，与外线之间黑褐色，前半有一列齿形黑斑；后翅灰黄色带褐色；腹部棕褐色。

**分布** 江苏、云南；日本，朝鲜。