

黑棕色，锯齿形；腹部浅黄色，部分有黑棕横条。

分布 河北、山东、浙江、福建；朝鲜。

白痣眉夜蛾 *Pangrapta albistigma* (Hampson) (图版 LXV-13)

Zethes albistigma Hampson, 1898, H. Bomb. N. H. Soc. 11: 457. (印度)

Zethea albistigma: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 602.

Pangrapta albistigma: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 409. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 877.

翅展 23 mm。头部白色杂黑色，下唇须外侧灰色杂黑灰色，第三节端部灰白色；胸部背面灰色杂褐色，足外侧黑灰色，跗节各节间有灰白斑；前翅白色带褐色，密布暗褐色细点，基线黑色，自前缘脉至中室，内线黑色，自前缘脉外斜，在中室处内凹，中室后内斜，环纹只现一黑粗点，肾纹白色，边缘暗褐色，中央有一暗褐曲纹，中线黑色，自前缘脉外斜至中室前缘，在中室间断，自中室后缘波曲内斜，外线黑色，自前缘脉外斜至 6 脉折角波曲内斜，亚端线在 5 脉前至前缘脉间为一列白色斜点，均围以暗褐边，内侧色暗，5 脉暗褐色；后翅白色，有暗褐细点，横脉处一白斑，由细黑线分割为几个小斑，内线、外线黑色，后者外方另一黑线，亚端区及端区由一黑线分割成双列白斑；腹部灰褐色。

分布 河北、陕西、浙江、湖北、四川；日本，朝鲜，印度。

遮眉夜蛾 *Pangrapta similistigma* Warren (图版 LXV-14)

Pangrapta similistigma Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 409, pl. 71h. (中国)

Diapolia similistigma: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171.

Pangrapta similistigma: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378.

翅展 30 mm。头部暗灰褐色，下唇须灰白色，布有黑色细点；胸部暗灰褐色，足外侧灰色，布有黑色细点，跗节外侧黑色，各节间有灰白斑；前翅棕色，内线黑色，自前缘脉外斜至中室折角内斜，环纹棕色，中央微白，肾纹白色，半圆形，内侧有二白点，外侧前后方各有一白点，中线黑色，外弯，外线外侧灰白色，中段内侧黑色，自前缘脉外斜至 6 脉后内斜，亚端线灰白色，前半锯齿形，端线黑色；后翅棕色，横脉纹白色，其中有黑色曲纹，后方有二白点，外线黑色衬白色，外弯，亚端线灰白色，内侧黑色，在中褶处有一齿形黑褐斑，端线黑色；腹部灰黑色。

分布 浙江、四川。

淡眉夜蛾 *Pangrapta umbrosa* (Leech) (图版 LXV-15)

Zethes umbrosa Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 601. (中国: Kiushiu, 湖北长阳, Chia-kou-ho)