

Diapolia umbrosa: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 407, pl. 71g. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 377. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 877.

翅展 33 mm。头部灰褐色，雄蛾触角有细纤毛丛，下唇须长向上弯曲，超过头顶，头顶布有黑点，下唇须第三节基部与端部灰白色；胸部背面灰褐色，布黑细点，足跗节外侧黑色，各节间有灰白斑；前翅淡褐色，带有紫灰色，基线褐色，自前缘脉外弯至亚中褶，内线褐色，波浪形外弯，在中室处明显内凸，环纹小，黄褐色黑边，肾纹窄小，橙黄色，边缘褐黑色，中央有一黑曲纹，中线黑褐色，自前缘脉外斜至中室下角，折角波曲内斜，外线黑色，自前缘直线外斜至 6 脉，折角波曲内斜，前半外方一灰白三角形大斑，其前缘有黑纵条，亚端线黑褐色锯齿形，前端外侧一白斜纹，内侧一黄白曲纹及一片黄褐色；后翅浅褐带紫灰色，各横线黑棕色，外线双线，后半锯齿形，亚端线仅后段可见波浪形；腹部灰褐色。

分布 陕西、浙江、湖北、江西、海南、云南；日本。

点眉夜蛾 *Pangrapta vasava* (Butler) (图版 LXV - 16)

Egnasia vasava Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 582. (日本横滨)

Pangrapta incisa Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. 49: 278.

Pangrapta vasava: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 409. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 877.

翅展 23 mm。头、胸、腹及前翅褐色杂灰色；前翅内线内方色暗，基线、内线白色，环纹、肾纹黄褐色黑边，前者小，中线黑色波浪形，前端内侧灰白色，外线黑色，在 7 脉折角波浪形内弯，后段外斜，前段外方一灰白三角形斑，端线黑褐色；后翅色同前翅，中线仅后半明显黑褐色，中室端有四个黑边圆形小白斑，外线双线黑色锯齿形，外侧衬白色，后半锯齿形，端线黑褐色；腹部腹面灰白色。

寄主 榆。

分布 黑龙江、山东、河南、江苏、湖北；日本，朝鲜。

灰眉夜蛾 *Pangrapta cana* (Leech) (图版 LXV - 17)

Zethes cana Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 592. (九江，宁波)

Pangrapta cana: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 406. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 377.

翅展 28 mm。头部与胸部褐灰色，下胸白色，布有黑棕色细点，足跗节外侧黑色，各节间有灰白斑；前翅褐灰色，布有暗褐细点，基线深褐色，自前缘脉至中室后缘，内线深褐色，自前缘脉波曲外斜至亚中褶折角内斜，环纹灰色，边缘黑褐色，肾纹白色，边缘黑褐色，中央有一黑曲纹，外线双线黑褐色，自前缘脉微曲外斜至 7 脉折角内斜，

较粗，至2脉后呈波浪形，外线前段外方有一灰色半圆形斑，亚端线由一列齿形黑点组成，不清晰，在7脉处外凸，中段外弯，前半段的黑点外有白色斜点纹，端区带有紫灰色，端线黑色，缘毛棕色；后翅褐灰色，布有暗褐细点，中区细点致密，中室端部有一白斑，其中有一黑色短线，外线黑棕色，波浪形，模糊，亚端线白色，锯齿形外弯，中段内外侧各有一列齿形黑斑点，端线黑色，翅外缘中部稍外突；腹部灰色。

分布 河南、浙江、福建、江西。

褐翅眉夜蛾 *Pangrapta adusta* (Leech) (图版 LXV - 18)

Zethes adusta Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 604. (Moupin, 湖北长阳)

Pangrapta adusta: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 408, pl. 74b. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 877. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 147. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1032.

翅展 25 mm。头、胸灰色杂暗褐色；前翅褐色，杂有灰色及黑褐色，内线黑色外弯，环纹与肾纹轮廓不清，褐色，边线黑色，中线黑褐色，不清晰，外斜至中室，在肾纹后较直内斜，外线黑褐色，自前缘脉外斜至中褶，折角内斜，中线与外线间黑褐色，成一宽曲带，外线前段外方有一三角形大灰色斑，其外方有赤褐色斜纹，外线外衬灰白色，亚端线隐约可见波浪形，缘毛赤褐色，端部间白色，后翅色似前翅，但外线以内带黑色，横脉纹黑色白边，中线白色波浪形，外线粗，黑色，外斜至中褶，折角微内弯，后端近达臀角，外线侧有赤褐色窄带，端线细，黑色，缘毛似前翅；腹部深灰褐色。

分布 湖北、湖南、四川；日本。

二斑眉夜蛾 *Pangrapta saucia* (Leech) (图版 LXV - 19)

Zethes saucia Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 600 (九江, 长阳, 宁波)

Pangrapta saucia: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 407, pl. 71g. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 148.

翅展 25 mm。头、胸暗灰褐色杂灰色；前翅褐色带紫灰色，密布黑褐细点，内线双线黑褐色，不很明显，在中室前稍内凹，环纹与肾纹隐约可见黑褐色，外线黑色，自前缘脉外斜至6脉后，折向内斜，在亚中褶后微外弯，外线内侧有一黑褐色模糊带，亚端线黑褐色波浪形，外线与亚端线间在7脉前有一半圆形灰白色斑，顶角有一灰白小斑，端线黑褐色，缘毛红褐色，后半灰色，中有暗褐线，后翅褐色带灰色，内线较直，黑色，横脉纹黑色，外线粗而模糊，褐黑色，在中褶处外凸，亚端线黑褐色，不清晰锯齿形，外区色较灰，端线黑色，缘毛褐色，中有暗褐线，端部赭白色；腹部黑灰色。

分布 浙江、湖北、江西、广东、西南。