

Pangrapta curtalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 408. —Sugin, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 876.

翅展 30 mm。头部与胸部浅褐色，翅基片及后胸杂有暗褐色，足跗节外侧褐色，各节间有白斑；前翅浅褐色，布有暗褐细点，基线黑褐色，仅在前缘区现双斜纹，内线双线褐色，波浪形外弯，内一线弱，环纹斜圆形，褐边，中线褐色，自前缘脉外斜至中室下角折向内斜并呈波浪形，外线双线褐色，自前缘脉直线外斜至 6 脉折角微波浪形内斜，折角前两线粗，折角后外一线模糊，亚端线黑褐色，间断为锯齿形点列，自顶角微曲内斜，外线外方有一近半圆形大灰斑，其后端达 6 脉，其外缘有几个黑褐纹，其前缘有一列白点；后翅浅褐色，中线黑褐色，模糊，外线双线黑褐色，仅 6 脉后明显，在中褶至 2 脉间外弯，两线之间带有黑褐色，亚端线隐约可见，黑褐色，锯齿形，在 3 脉处齿尖近达翅外缘，中线至亚端线间布有黑褐细点，端线由一系列新月形黑纹组成，缘毛褐色；腹部浅灰褐色，背面色暗并布有黑褐细点。

分布 江苏；朝鲜，日本。

暗影眉夜蛾 *Pangrapta disruptalis* (Walker) (图版 LXV-9)

Saraca disruptalis Walker, [1866] 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 34: 1190. (上海)

翅展 33 mm。头部与胸部暗褐色，足跗节有白斑；前翅暗褐色，基线黑色，仅在中室前可见，内线黑色，波曲外弯，不清晰，环纹隐约可见黑边，近圆形，肾纹为一模糊黑褐斑，中线与外线溶合成一黑褐带，外线黑色，直线外斜达中褶，折角微波曲内斜，外侧在 6 脉前有一灰白色近半圆形大斑，亚端线隐约可见，黑褐色，间断为点列，内侧衬褐白色，缘毛端部灰色；后翅暗褐色，中线粗，黑色，横脉纹窄，外线双线黑色，外斜至 3 脉折向内斜并波曲，亚端线黑色，间断为点列，内侧衬褐白色，缘毛端部灰色；腹部暗褐色。

分布 江苏。

饰眉夜蛾 *Pangrapta ornata* (Leech) (图版 LXV-10)

Zethes ornata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 605. (湖北宜昌)

Diapolia ornata: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 171.

Pangrapta ornata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 408. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 378.

翅展 23mm。头部紫褐色，下唇须外侧暗灰色；胸部紫褐色；前翅紫红色，外半部带有金褐色，前缘黑色，外半部有几个白点，基线黑色杂白色，自前缘脉外弯至 1 脉，内线黑色杂白色，前后端内侧衬白色，中段间断，环纹只现一模糊的黑点，肾纹金褐色，内侧黑色，中线黑色，模糊，自前缘脉至中室外不清晰外斜，在 6 脉后内斜，外线